



# 褥瘡処置災害用簡易マニュアル

国立長寿医療研究センター褥瘡対策チーム 作成:薬剤部 2011.3



## 【水疱後の痂皮形成】

硬く乾燥している。踵にみられる。

〈処置の必要なし〉



## 【真皮露出・びらん】

リフラップ3+テラジア  
パスタ7(火傷にも使用  
可能)又は創傷被覆材


〈処置で対応可〉



## 【皮下組織までの侵襲】

リフラップ3+テラジア  
パスタ7(火傷にも使用  
可能)又は創傷被覆材

〈処置で対応可〉



## 【皮下組織までの侵襲】

滲出液ありはユーパ  
スタ又はヨードコート、  
なしはゲーベン。  
リフラップテラジアも可。

〈処置で対応可〉



## 【軟化した黄色壊死】

滲出液ありはユーパス  
タ又はヨードコート、  
なしはゲーベン。

〈処置で対応可〉



## 【皮膚の発赤と一部びらん】

乾燥は禁忌。ゲーベン  
で湿潤保持。

〈処置で対応可〉

被覆はガーゼ+フィルムで行い、塗布量は厚さ3mm程度にする。



# 褥瘡処置災害用簡易マニュアル


国立長寿医療研究センター褥瘡対策チーム 作成:薬剤部 2011.3



## 【固着した黄色壊死】

乾いた壊死組織はゲーベンで軟化させる。

〈処置で対応可〉



## 【軟化前の黄色壊死】

滲出液ありはユーパスタ又はヨードコート、なしはゲーベンで湿潤保持。


〈処置で対応可〉



## 【壊死組織が混在】

滲出液ありはユーパスタ又はヨードコート、なしはゲーベン。

〈処置で対応可〉



## 【潰瘍形成】

滲出液ありはユーパスタ又はヨードコート、なしはゲーベン。

〈処置で対応可〉



## 【硬い黄色壊死】

滲出液ありはユーパスタ又はヨードコート、なしはゲーベン。

〈病院へ搬送〉



## 【黒色壊死】

辺縁部から滲出液ありはユーパスタ又はヨードコート、なしはゲーベン。

〈病院へ搬送〉

被覆はガーゼ+フィルムで行い、塗布量は厚さ3mm程度にする。