

# I. 背景因子調査

1. 病歴
  - 1) [既往歴・現病歴](#)
  - 2) [薬剤治療](#)
  - 3) [手術歴](#)
  - 4) [入院歴](#)
2. [婦人科系（女性のみ）](#)
3. 日常生活と健康
  - 1) [健康](#)
  - 2) [喫煙](#)
  - 3) [運動・スポーツ活動](#)
  - 4) [外出](#)
  - 5) [健康関連QOL尺度（SF-36、身体機能）](#)
  - 6) [要介護認定](#)
  - 7) [運転](#)
4. [視覚](#)
5. [聴覚](#)
6. [転倒](#)
7. 排尿
  - 1) [排尿症状](#)
  - 2) [尿失禁](#)
8. フレイル
  - 1) [簡易フレイル・インデックス](#)
  - 2) [社会的フレイル](#)
9. [エジンバラ利き手検査](#)

1. 病歴
  - 1) 既往歴・現病歴

脳血管障害・脳卒中（脳梗塞、脳血栓、脳出血）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	216	97.7	250	97.7	227	94.6	112	86.8	805	95.2
	女性	259	99.6	251	98.8	192	96.0	120	93.0	822	97.5

	計	475	98.8	501	98.2	419	95.2	232	89.9	1627	96.3
治療中	男性	2	0.9	6	2.3	11	4.6	8	6.2	27	3.2
	女性	0	0.0	0	0.0	3	1.5	7	5.4	10	1.2
	計	2	0.4	6	1.2	14	3.2	15	5.8	37	2.2
以前治療した	男性	1	0.5	0	0.0	2	0.8	9	7.0	12	1.4
	女性	1	0.4	3	1.2	5	2.5	1	0.8	10	1.2
	計	2	0.4	3	0.6	7	1.6	10	3.9	22	1.3
治療せず	男性	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.1
	計	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	0.2

## 高血圧

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	173	78.3	158	61.7	126	52.5	61	47.3	518	61.2
	女性	239	91.9	192	75.6	117	58.5	55	42.6	603	71.5
	計	412	85.7	350	68.6	243	55.2	116	45.0	1121	66.4
治療中	男性	44	19.9	93	36.3	101	42.1	59	45.7	297	35.1
	女性	15	5.8	52	20.5	79	39.5	71	55.0	217	25.7
	計	59	12.3	145	28.4	180	40.9	130	50.4	514	30.4
以前治療した	男性	2	0.9	3	1.2	13	5.4	7	5.4	25	3.0
	女性	4	1.5	8	3.1	4	2.0	3	2.3	19	2.3
	計	6	1.2	11	2.2	17	3.9	10	3.9	44	2.6
治療せず	男性	2	0.9	2	0.8	0	0.0	2	1.6	6	0.7
	女性	2	0.8	2	0.8	0	0.0	0	0.0	4	0.5
	計	4	0.8	4	0.8	0	0.0	2	0.8	10	0.6

## 狭心症・心筋梗塞

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	217	98.2	244	95.3	222	92.5	108	83.7	791	93.5
	女性	259	99.6	249	98.0	189	94.5	117	90.7	814	96.6
	計	476	99.0	493	96.7	411	93.4	225	87.2	1605	95.0
治療中	男性	2	0.9	10	3.9	17	7.1	15	11.6	44	5.2
	女性	1	0.4	4	1.6	7	3.5	11	8.5	23	2.7
	計	3	0.6	14	2.7	24	5.5	26	10.1	67	4.0
以前治療した	男性	2	0.9	2	0.8	1	0.4	6	4.7	11	1.3
	女性	0	0.0	1	0.4	3	1.5	1	0.8	5	0.6
	計	2	0.4	3	0.6	4	0.9	7	2.7	16	0.9
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1

## その他の心臓病（不整脈、弁膜症、心不全など）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
--	--	---------	--	---------	--	---------	--	-------	--	---	--

		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	211	95.5	226	88.3	207	86.3	96	74.4	740	87.5
	女性	251	96.5	240	94.5	178	89.0	114	88.4	783	92.9
	計	462	96.0	466	91.4	385	87.5	210	81.4	1523	90.2
治療中	男性	2	0.9	12	4.7	14	5.8	25	19.4	53	6.3
	女性	0	0.0	4	1.6	10	5.0	10	7.8	24	2.8
	計	2	0.4	16	3.1	24	5.5	35	13.6	77	4.6
以前治療した	男性	5	2.3	5	2.0	4	1.7	8	6.2	22	2.6
	女性	4	1.5	3	1.2	7	3.5	2	1.6	16	1.9
	計	9	1.9	8	1.6	11	2.5	10	3.9	38	2.2
治療せず	男性	3	1.4	13	5.1	15	6.3	0	0.0	31	3.7
	女性	5	1.9	7	2.8	5	2.5	3	2.3	20	2.4
	計	8	1.7	20	3.9	20	4.5	3	1.2	51	3.0

#### 脂質異常症

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	184	83.3	193	75.4	178	74.2	100	77.5	655	77.4
	女性	229	88.1	171	67.3	109	54.5	91	70.5	600	71.2
	計	413	85.9	364	71.4	287	65.2	191	74.0	1255	74.3
治療中	男性	32	14.5	55	21.5	58	24.2	28	21.7	173	20.4
	女性	25	9.6	73	28.7	87	43.5	36	27.9	221	26.2
	計	57	11.9	128	25.1	145	33.0	64	24.8	394	23.3
以前治療した	男性	4	1.8	5	2.0	4	1.7	1	0.8	14	1.7
	女性	4	1.5	8	3.1	3	1.5	1	0.8	16	1.9
	計	8	1.7	13	2.5	7	1.6	2	0.8	30	1.8
治療せず	男性	1	0.5	3	1.2	0	0.0	0	0.0	4	0.5
	女性	2	0.8	2	0.8	1	0.5	1	0.8	6	0.7
	計	3	0.6	5	1.0	1	0.2	1	0.4	10	0.6

#### 腎臓病

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	215	97.3	250	97.7	229	95.4	121	93.8	815	96.3
	女性	256	98.5	245	96.5	193	96.5	126	97.7	820	97.3
	計	471	97.9	495	97.1	422	95.9	247	95.7	1635	96.8
治療中	男性	2	0.9	2	0.8	2	0.8	2	1.6	8	0.9
	女性	3	1.2	4	1.6	2	1.0	1	0.8	10	1.2
	計	5	1.0	6	1.2	4	0.9	3	1.2	18	1.1
以前治療した	男性	4	1.8	4	1.6	8	3.3	6	4.7	22	2.6
	女性	1	0.4	4	1.6	5	2.5	1	0.8	11	1.3
	計	5	1.0	8	1.6	13	3.0	7	2.7	33	2.0
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.8	2	0.2
	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.4	3	0.2

## 肝臓病

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	216	97.7	252	98.4	230	95.8	128	99.2	826	97.6
	女性	258	99.2	245	96.5	193	96.5	125	96.9	821	97.4
	計	474	98.5	497	97.5	423	96.1	253	98.1	1647	97.5
治療中	男性	1	0.5	1	0.4	4	1.7	0	0.0	6	0.7
	女性	1	0.4	2	0.8	3	1.5	1	0.8	7	0.8
	計	2	0.4	3	0.6	7	1.6	1	0.4	13	0.8
以前治療した	男性	4	1.8	3	1.2	6	2.5	1	0.8	14	1.7
	女性	1	0.4	5	2.0	3	1.5	3	2.3	12	1.4
	計	5	1.0	8	1.6	9	2.0	4	1.6	26	1.5
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	2	0.8	1	0.5	0	0.0	3	0.4
	計	0	0.0	2	0.4	1	0.2	0	0.0	3	0.2

## 胆石・胆嚢炎

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	213	96.4	240	93.8	221	92.1	111	86.0	785	92.8
	女性	255	98.1	232	91.3	184	92.0	114	88.4	785	93.1
	計	468	97.3	472	92.5	405	92.0	225	87.2	1570	93.0
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.8	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.8	3	0.2
以前治療した	男性	7	3.2	13	5.1	13	5.4	14	10.9	47	5.6
	女性	3	1.2	17	6.7	14	7.0	10	7.8	44	5.2
	計	10	2.1	30	5.9	27	6.1	24	9.3	91	5.4
治療せず	男性	1	0.5	3	1.2	5	2.1	3	2.3	12	1.4
	女性	2	0.8	5	2.0	2	1.0	4	3.1	13	1.5
	計	3	0.6	8	1.6	7	1.6	7	2.7	25	1.5

## 糖尿病

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	209	94.6	223	87.1	202	84.2	106	82.2	740	87.5
	女性	250	96.2	234	92.1	173	86.5	118	91.5	775	91.9
	計	459	95.4	457	89.6	375	85.2	224	86.8	1515	89.7
治療中	男性	11	5.0	29	11.3	38	15.8	20	15.5	98	11.6
	女性	9	3.5	18	7.1	25	12.5	11	8.5	63	7.5
	計	20	4.2	47	9.2	63	14.3	31	12.0	161	9.5
以前治療した	男性	1	0.5	2	0.8	0	0.0	2	1.6	5	0.6
	女性	1	0.4	2	0.8	1	0.5	0	0.0	4	0.5
	計	2	0.4	4	0.8	1	0.2	2	0.8	9	0.5
治療せず	男性	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	0.8	3	0.4
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.1

計 0 0.0 2 0.4 1 0.2 1 0.4 4 0.2

胃・十二指腸潰瘍

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	210	95.0	208	81.3	200	83.3	106	82.2	724	85.6
	女性	249	95.8	237	93.3	186	93.0	118	91.5	790	93.7
	計	459	95.4	445	87.3	386	87.7	224	86.8	1514	89.6
治療中	男性	0	0.0	3	1.2	2	0.8	1	0.8	6	0.7
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	2.3	4	0.5
	計	0	0.0	4	0.8	2	0.5	4	1.6	10	0.6
以前治療した	男性	9	4.1	42	16.4	36	15.0	21	16.3	108	12.8
	女性	10	3.8	15	5.9	12	6.0	8	6.2	45	5.3
	計	19	4.0	57	11.2	48	10.9	29	11.2	153	9.1
治療せず	男性	2	0.9	3	1.2	2	0.8	1	0.8	8	0.9
	女性	1	0.4	1	0.4	2	1.0	0	0.0	4	0.5
	計	3	0.6	4	0.8	4	0.9	1	0.4	12	0.7

結核・肋膜炎

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	221	100.0	252	98.4	236	98.3	116	89.9	825	97.5
	女性	257	98.8	249	98.0	196	98.0	121	93.8	823	97.6
	計	478	99.4	501	98.2	432	98.2	237	91.9	1648	97.6
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
以前治療した	男性	0	0.0	4	1.6	3	1.3	13	10.1	20	2.4
	女性	3	1.2	5	2.0	2	1.0	8	6.2	18	2.1
	計	3	0.6	9	1.8	5	1.1	21	8.1	38	2.2
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	2	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	3	0.7	0	0.0	3	0.2

喘息

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.1
なし	男性	204	92.3	245	95.7	231	96.3	125	96.9	805	95.2
	女性	246	94.6	238	93.7	186	93.0	123	95.3	793	94.1
	計	450	93.6	483	94.7	417	94.8	248	96.1	1598	94.6
治療中	男性	3	1.4	3	1.2	5	2.1	3	2.3	14	1.7
	女性	4	1.5	5	2.0	4	2.0	3	2.3	16	1.9
	計	7	1.5	8	1.6	9	2.0	6	2.3	30	1.8

以前治療した	男性	14	6.3	8	3.1	4	1.7	1	0.8	27	3.2
	女性	10	3.8	11	4.3	9	4.5	2	1.6	32	3.8
	計	24	5.0	19	3.7	13	3.0	3	1.2	59	3.5
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1

#### 慢性気管支炎

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	220	99.5	253	98.8	233	97.1	124	96.1	830	98.1
	女性	254	97.7	246	96.9	196	98.0	126	97.7	822	97.5
	計	474	98.5	499	97.8	429	97.5	250	96.9	1652	97.8
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	5	2.1	2	1.6	7	0.8
	女性	2	0.8	3	1.2	2	1.0	3	2.3	10	1.2
	計	2	0.4	3	0.6	7	1.6	5	1.9	17	1.0
以前治療した	男性	0	0.0	3	1.2	2	0.8	3	2.3	8	0.9
	女性	4	1.5	5	2.0	2	1.0	0	0.0	11	1.3
	計	4	0.8	8	1.6	4	0.9	3	1.2	19	1.1
治療せず	男性	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1

#### 貧血

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.1
なし	男性	218	98.6	249	97.3	234	97.5	125	96.9	826	97.6
	女性	204	78.5	198	78.0	170	85.0	117	90.7	689	81.7
	計	422	87.7	447	87.6	404	91.8	242	93.8	1515	89.7
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	2	0.2
	女性	2	0.8	1	0.4	1	0.5	1	0.8	5	0.6
	計	2	0.4	1	0.2	3	0.7	1	0.4	7	0.4
以前治療した	男性	2	0.9	5	2.0	3	1.3	4	3.1	14	1.7
	女性	53	20.4	53	20.9	29	14.5	9	7.0	144	17.1
	計	55	11.4	58	11.4	32	7.3	13	5.0	158	9.4
治療せず	男性	1	0.5	1	0.4	1	0.4	0	0.0	3	0.4
	女性	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	1.6	4	0.5
	計	2	0.4	2	0.4	1	0.2	2	0.8	7	0.4

#### 骨粗鬆症

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%

なし	男性	218	98.6	256	100.0	234	97.5	125	96.9	833	98.5
	女性	256	98.5	232	91.3	144	72.0	77	59.7	709	84.1
	計	474	98.5	488	95.7	378	85.9	202	78.3	1542	91.3
治療中	男性	3	1.4	0	0.0	3	1.3	2	1.6	8	0.9
	女性	3	1.2	19	7.5	40	20.0	43	33.3	105	12.5
	計	6	1.2	19	3.7	43	9.8	45	17.4	113	6.7
以前治療した	男性	0	0.0	0	0.0	2	0.8	1	0.8	3	0.4
	女性	1	0.4	3	1.2	15	7.5	8	6.2	27	3.2
	計	1	0.2	3	0.6	17	3.9	9	3.5	30	1.8
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.8	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.8	2	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.8	4	0.2

#### 関節リウマチ

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	221	100.0	253	98.8	237	98.8	129	100.0	840	99.3
	女性	259	99.6	244	96.1	194	97.0	122	94.6	819	97.2
	計	480	99.8	497	97.5	431	98.0	251	97.3	1659	98.2
治療中	男性	0	0.0	2	0.8	2	0.8	0	0.0	4	0.5
	女性	1	0.4	9	3.5	4	2.0	3	2.3	17	2.0
	計	1	0.2	11	2.2	6	1.4	3	1.2	21	1.2
以前治療した	男性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.5	4	3.1	5	0.6
	計	0	0.0	1	0.2	2	0.5	4	1.6	7	0.4
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	2	0.2
	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	2	0.1

#### 変形性膝関節症

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	221	100.0	249	97.3	228	95.0	118	91.5	816	96.5
	女性	248	95.4	224	88.2	163	81.5	96	74.4	731	86.7
	計	469	97.5	473	92.7	391	88.9	214	82.9	1547	91.6
治療中	男性	0	0.0	4	1.6	5	2.1	4	3.1	13	1.5
	女性	5	1.9	8	3.1	14	7.0	16	12.4	43	5.1
	計	5	1.0	12	2.4	19	4.3	20	7.8	56	3.3
以前治療した	男性	0	0.0	3	1.2	6	2.5	7	5.4	16	1.9
	女性	4	1.5	20	7.9	20	10.0	14	10.9	58	6.9
	計	4	0.8	23	4.5	26	5.9	21	8.1	74	4.4
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	3	1.2	2	0.8	3	1.5	3	2.3	11	1.3
	計	3	0.6	2	0.4	4	0.9	3	1.2	12	0.7

#### 痛風・高尿酸血症

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.1
なし	男性	197	89.1	217	84.8	206	85.8	110	85.3	730	86.3
	女性	259	99.6	253	99.6	195	97.5	125	96.9	832	98.7
	計	456	94.8	470	92.2	401	91.1	235	91.1	1562	92.5
治療中	男性	19	8.6	28	10.9	23	9.6	15	11.6	85	10.0
	女性	1	0.4	1	0.4	4	2.0	3	2.3	9	1.1
	計	20	4.2	29	5.7	27	6.1	18	7.0	94	5.6
以前治療した	男性	5	2.3	10	3.9	9	3.8	3	2.3	27	3.2
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.8	2	0.2
	計	5	1.0	10	2.0	10	2.3	4	1.6	29	1.7
治療せず	男性	0	0.0	1	0.4	2	0.8	0	0.0	3	0.4
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	1	0.2	2	0.5	0	0.0	3	0.2

#### 副甲状腺疾患

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	220	99.5	256	100.0	240	100.0	129	100.0	845	99.9
	女性	258	99.2	253	99.6	200	100.0	129	100.0	840	99.6
	計	478	99.4	509	99.8	440	100.0	258	100.0	1685	99.8
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
以前治療した	男性	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1

#### 甲状腺疾患

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	217	98.2	254	99.2	235	97.9	125	96.9	831	98.2
	女性	240	92.3	225	88.6	182	91.0	125	96.9	772	91.6
	計	457	95.0	479	93.9	417	94.8	250	96.9	1603	94.9
治療中	男性	2	0.9	2	0.8	3	1.3	0	0.0	7	0.8
	女性	7	2.7	8	3.1	10	5.0	0	0.0	25	3.0
	計	9	1.9	10	2.0	13	3.0	0	0.0	32	1.9
以前治療した	男性	1	0.5	0	0.0	1	0.4	2	1.6	4	0.5
	女性	11	4.2	18	7.1	5	2.5	3	2.3	37	4.4
	計	12	2.5	18	3.5	6	1.4	5	1.9	41	2.4

治療せず	男性	1	0.5	0	0.0	1	0.4	2	1.6	4	0.5
	女性	2	0.8	3	1.2	3	1.5	1	0.8	9	1.1
	計	3	0.6	3	0.6	4	0.9	3	1.2	13	0.8

がん

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	216	97.7	233	91.0	206	85.8	97	75.2	752	88.9
	女性	241	92.7	227	89.4	173	86.5	110	85.3	751	89.1
	計	457	95.0	460	90.2	379	86.1	207	80.2	1503	89.0
治療中	男性	0	0.0	4	1.6	6	2.5	4	3.1	14	1.7
	女性	7	2.7	6	2.4	5	2.5	1	0.8	19	2.3
	計	7	1.5	10	2.0	11	2.5	5	1.9	33	2.0
以前治療した	男性	5	2.3	18	7.0	27	11.3	28	21.7	78	9.2
	女性	12	4.6	20	7.9	22	11.0	17	13.2	71	8.4
	計	17	3.5	38	7.5	49	11.1	45	17.4	149	8.8
治療せず	男性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	0.2
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.8	2	0.2
	計	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.4	4	0.2

骨折

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	139	62.9	170	66.4	166	69.2	100	77.5	575	68.0
	女性	213	81.9	196	77.2	135	67.5	86	66.7	630	74.7
	計	352	73.2	366	71.8	301	68.4	186	72.1	1205	71.3
治療中	男性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	0.8	3	0.4
	女性	0	0.0	1	0.4	2	1.0	0	0.0	3	0.4
	計	0	0.0	2	0.4	3	0.7	1	0.4	6	0.4
以前治療した	男性	79	35.7	80	31.3	73	30.4	28	21.7	260	30.7
	女性	47	18.1	57	22.4	62	31.0	42	32.6	208	24.7
	計	126	26.2	137	26.9	135	30.7	70	27.1	468	27.7
治療せず	男性	3	1.4	5	2.0	0	0.0	0	0.0	8	0.9
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.8	2	0.2
	計	3	0.6	5	1.0	1	0.2	1	0.4	10	0.6

前立腺肥大

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	219	99.1	237	92.6	194	80.8	84	65.1	734	86.8
	女性	260	100.0	254	100.0	200	100.0	129	100.0	843	100.0
	計	479	99.6	491	96.3	394	89.5	213	82.6	1577	93.4
治療中	男性	2	0.9	11	4.3	28	11.7	25	19.4	66	7.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	2	0.4	11	2.2	28	6.4	25	9.7	66	3.9
以前治療した	男性	0	0.0	8	3.1	12	5.0	19	14.7	39	4.6

	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	8	1.6	12	2.7	19	7.4	39	2.3
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	6	2.5	1	0.8	7	0.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	6	1.4	1	0.4	7	0.4

## 認知症

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	221	100.0	256	100.0	240	100.0	124	96.1	841	99.4
	女性	260	100.0	254	100.0	200	100.0	126	97.7	840	99.6
	計	481	100.0	510	100.0	440	100.0	250	96.9	1681	99.5
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.1	4	0.5
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.9	5	0.3
以前治療した	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	3	0.2

## パーキンソン病

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	221	100.0	254	99.2	239	99.6	128	99.2	842	99.5
	女性	260	100.0	253	99.6	200	100.0	129	100.0	842	99.9
	計	481	100.0	507	99.4	439	99.8	257	99.6	1684	99.7
治療中	男性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	0.8	3	0.4
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.4	4	0.2
以前治療した	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

## 2) 薬剤治療

### 処方薬の定期的な服用

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
服用している	男性	95	43.0	157	61.3	173	72.1	109	84.5	534	63.1
	女性	73	28.1	147	57.9	159	79.5	112	86.8	491	58.2
	計	168	34.9	304	59.6	332	75.5	221	85.7	1025	60.7

服用していない	男性	126	57.0	99	38.7	67	27.9	20	15.5	312	36.9
	女性	187	71.9	107	42.1	41	20.5	17	13.2	352	41.8
	計	313	65.1	206	40.4	108	24.5	37	14.3	664	39.3

種別処方薬（定期的な服用者のみ：複数回答）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
高血圧	男性	45	47.4	96	61.1	102	59.0	59	54.1	302	56.6
	女性	16	21.9	54	36.7	80	50.3	73	65.2	223	45.4
	計	61	36.3	150	49.3	182	54.8	132	59.7	525	51.2
狭心症・心筋梗塞	男性	3	3.2	10	6.4	17	9.8	16	14.7	46	8.6
	女性	1	1.4	4	2.7	8	5.0	11	9.8	24	4.9
	計	4	2.4	14	4.6	25	7.5	27	12.2	70	6.8
不整脈	男性	1	1.1	10	6.4	13	7.5	17	15.6	41	7.7
	女性	0	0.0	2	1.4	8	5.0	9	8.0	19	3.9
	計	1	0.6	12	3.9	21	6.3	26	11.8	60	5.9
心不全	男性	1	1.1	1	0.6	0	0.0	3	2.8	5	0.9
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.8	3	0.6
	計	1	0.6	1	0.3	1	0.3	5	2.3	8	0.8
糖尿病	男性	8	8.4	28	17.8	36	20.8	18	16.5	90	16.9
	女性	8	11.0	18	12.2	22	13.8	10	8.9	58	11.8
	計	16	9.5	46	15.1	58	17.5	28	12.7	148	14.4
脳血管障害	男性	2	2.1	6	3.8	11	6.4	10	9.2	29	5.4
	女性	0	0.0	0	0.0	2	1.3	6	5.4	8	1.6
	計	2	1.2	6	2.0	13	3.9	16	7.2	37	3.6
不眠・不安	男性	3	3.2	5	3.2	9	5.2	7	6.4	24	4.5
	女性	6	8.2	6	4.1	12	7.5	17	15.2	41	8.4
	計	9	5.4	11	3.6	21	6.3	24	10.9	65	6.3
うつ	男性	5	5.3	1	0.6	1	0.6	0	0.0	7	1.3
	女性	2	2.7	0	0.0	0	0.0	2	1.8	4	0.8
	計	7	4.2	1	0.3	1	0.3	2	0.9	11	1.1
認知症	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.7	4	0.7
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.3	5	0.5
統合失調症	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4
	計	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
脂質異常症	男性	33	34.7	54	34.4	59	34.1	28	25.7	174	32.6
	女性	24	32.9	72	49.0	87	54.7	36	32.1	219	44.6
	計	57	33.9	126	41.4	146	44.0	64	29.0	393	38.3
胃腸障害	男性	8	8.4	17	10.8	33	19.1	20	18.3	78	14.6
	女性	10	13.7	15	10.2	26	16.4	23	20.5	74	15.1
	計	18	10.7	32	10.5	59	17.8	43	19.5	152	14.8
ホルモン剤	男性	2	2.1	1	0.6	7	4.0	2	1.8	12	2.2
	女性	13	17.8	13	8.8	9	5.7	1	0.9	36	7.3
	計	15	8.9	14	4.6	16	4.8	3	1.4	48	4.7
骨粗鬆症	男性	3	3.2	0	0.0	3	1.7	2	1.8	8	1.5

	女性	4	5.5	20	13.6	40	25.2	42	37.5	106	21.6
	計	7	4.2	20	6.6	43	13.0	44	19.9	114	11.1
その他	男性	42	44.2	66	42.0	79	45.7	54	49.5	241	45.1
	女性	31	42.5	46	31.3	47	29.6	34	30.4	158	32.2
	計	73	43.5	112	36.8	126	38.0	88	39.8	399	38.9

### 3) 手術歴

#### 頭部手術既往

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	4	1.8	4	1.6	4	1.7	6	4.7	18	2.1
	女性	1	0.4	2	0.8	3	1.5	1	0.8	7	0.8
	計	5	1.0	6	1.2	7	1.6	7	2.7	25	1.5
なし	男性	217	98.2	252	98.4	236	98.3	123	95.3	828	97.9
	女性	259	99.6	252	99.2	197	98.5	128	99.2	836	99.2
	計	476	99.0	504	98.8	433	98.4	251	97.3	1664	98.5

### 4) 入院歴

#### 過去2年間の入院

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	13	5.9	31	12.1	38	15.8	30	23.3	112	13.2
	女性	20	7.7	24	9.4	37	18.5	24	18.6	105	12.5
	計	33	6.9	55	10.8	75	17.0	54	20.9	217	12.8
なし	男性	208	94.1	225	87.9	202	84.2	99	76.7	734	86.8
	女性	240	92.3	230	90.6	163	81.5	105	81.4	738	87.5
	計	448	93.1	455	89.2	365	83.0	204	79.1	1472	87.2

## 2. 婦人科系（女性のみ）

#### 月経の有無

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり		33	12.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	3.9
なし		207	79.6	254	100.0	200	100.0	129	100.0	790	93.7
わからない		20	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	2.4

#### 最終月経年齢（閉経女性のみ）

	50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
年齢	50.3	3.5	207	50.7	4.1	253	49.8	4.9	198	50.2	5.6	122	50.3	4.4	780

## 3. 日常生活と健康

1) 健康

自覚的健康度

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
非常に良い	男性	28	12.7	9	3.5	11	4.6	2	1.6	50	5.9
	女性	13	5.0	8	3.1	7	3.5	4	3.1	32	3.8
	計	41	8.5	17	3.3	18	4.1	6	2.3	82	4.9
良い	男性	93	42.1	91	35.5	99	41.3	30	23.3	313	37.0
	女性	91	35.0	68	26.8	38	19.0	23	17.8	220	26.1
	計	184	38.3	159	31.2	137	31.1	53	20.5	533	31.6
普通	男性	96	43.4	139	54.3	120	50.0	81	62.8	436	51.5
	女性	151	58.1	168	66.1	132	66.0	85	65.9	536	63.6
	計	247	51.4	307	60.2	252	57.3	166	64.3	972	57.5
悪い	男性	4	1.8	17	6.6	10	4.2	15	11.6	46	5.4
	女性	5	1.9	10	3.9	23	11.5	15	11.6	53	6.3
	計	9	1.9	27	5.3	33	7.5	30	11.6	99	5.9
非常に悪い	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	3	0.2

2) 喫煙

喫煙の有無

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
以前から吸わない	男性	96	43.4	74	28.9	69	28.8	38	29.5	277	32.7
	女性	226	86.9	216	85.0	189	94.5	125	96.9	756	89.7
	計	322	66.9	290	56.9	258	58.6	163	63.2	1033	61.2
やめた	男性	87	39.4	129	50.4	145	60.4	82	63.6	443	52.4
	女性	22	8.5	32	12.6	8	4.0	4	3.1	66	7.8
	計	109	22.7	161	31.6	153	34.8	86	33.3	509	30.1
現在吸っている	男性	38	17.2	53	20.7	26	10.8	9	7.0	126	14.9
	女性	12	4.6	6	2.4	3	1.5	0	0.0	21	2.5
	計	50	10.4	59	11.6	29	6.6	9	3.5	147	8.7

禁煙者の喫煙開始年齢

	50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	19.6	1.5	87	20.0	2.6	128	20.6	3.7	144	21.3	5.5	81	20.4	3.6	440
女性	21.8	4.2	22	22.0	5.1	32	31.0	7.3	8	30.0	9.1	4	23.5	6.3	66
計	20.0	2.5	109	20.4	3.3	160	21.1	4.6	152	21.8	5.9	85	20.8	4.2	506

禁煙者の禁煙年齢

	50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数

男性	35.3	9.8	87	40.6	12.4	128	46.2	13.5	144	51.0	14.0	82	43.3	13.7	441
女性	35.5	10.5	22	41.2	14.3	32	55.6	15.7	8	54.5	21.4	4	41.8	15.1	66
計	35.3	9.9	109	40.8	12.7	160	46.7	13.8	152	51.2	14.3	86	43.1	13.9	507

禁煙者の過去の喫煙本数（本／日）

	50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	18.3	8.3	87	18.9	8.2	128	20.9	9.5	143	19.3	9.7	81	19.5	9.0	439
女性	11.3	6.3	22	12.2	8.8	32	15.5	10.7	8	12.0	4.0	4	12.3	8.0	66
計	16.9	8.4	109	17.6	8.7	160	20.6	9.6	151	19.0	9.6	85	18.6	9.2	505

喫煙者の喫煙開始年齢

	50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	20.7	3.7	38	19.7	2.6	53	21.3	4.9	26	25.0	15.0	9	20.7	5.3	126
女性	26.8	13.6	12	28.2	11.5	6	37.7	19.1	3	.	.	0	28.8	13.6	21
計	22.2	7.7	50	20.6	4.9	59	23.0	8.6	29	25.0	15.0	9	21.9	7.6	147

喫煙者の現在の喫煙本数（本／日）

	50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	16.0	6.1	38	18.0	6.7	53	16.4	6.8	26	13.9	5.8	9	16.8	6.5	126
女性	11.8	6.0	12	10.5	4.4	6	16.7	5.8	3	.	.	0	12.1	5.7	21
計	15.0	6.3	50	17.3	6.9	59	16.4	6.6	29	13.9	5.8	9	16.1	6.6	147

3) 運動・スポーツ活動

過去1年間の運動習慣（1回20分以上、1ヶ月に1回以上）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		あり	男性	121	54.8	168	65.6	179	74.6	91	70.5
	女性	118	45.4	136	53.5	138	69.0	84	65.1	476	56.5
	計	239	49.7	304	59.6	317	72.0	175	67.8	1035	61.3
なし	男性	100	45.2	88	34.4	61	25.4	38	29.5	287	33.9
	女性	142	54.6	118	46.5	62	31.0	45	34.9	367	43.5
	計	242	50.3	206	40.4	123	28.0	83	32.2	654	38.7

4) 外出

外出（仕事、買い物、散歩、通院なども含む）する頻度

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
毎日1回以上	男性	210	95.0	228	89.1	196	81.7	94	72.9	728	86.1
	女性	225	86.5	193	76.0	133	66.5	67	51.9	618	73.3

	計	435	90.4	421	82.5	329	74.8	161	62.4	1346	79.7
2～3日に1回程度	男性	9	4.1	27	10.5	38	15.8	29	22.5	103	12.2
	女性	32	12.3	56	22.0	62	31.0	49	38.0	199	23.6
	計	41	8.5	83	16.3	100	22.7	78	30.2	302	17.9
1週間に1回程度	男性	2	0.9	1	0.4	6	2.5	5	3.9	14	1.7
	女性	3	1.2	5	2.0	3	1.5	9	7.0	20	2.4
	計	5	1.0	6	1.2	9	2.0	14	5.4	34	2.0
ほとんど外出しない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	2	1.0	4	3.1	6	0.7
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.5	5	1.9	7	0.4

主な外出目的（外出が毎日1回以上もしくは2～3日に1回程度の場合：複数回答）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
仕事	男性	212	96.8	190	74.5	91	38.9	15	12.2	508	61.1
	女性	204	79.4	140	56.2	44	22.6	8	6.9	396	48.5
	計	416	87.4	330	65.5	135	31.5	23	9.6	904	54.9
買い物、用足し	男性	181	82.6	208	81.6	185	79.1	102	82.9	676	81.3
	女性	253	98.4	245	98.4	188	96.4	108	93.1	794	97.2
	計	434	91.2	453	89.9	373	86.9	210	87.9	1470	89.2
散歩	男性	64	29.2	115	45.1	128	54.7	76	61.8	383	46.1
	女性	56	21.8	76	30.5	103	52.8	59	50.9	294	36.0
	計	120	25.2	191	37.9	231	53.8	135	56.5	677	41.1
通院	男性	3	1.4	15	5.9	17	7.3	18	14.6	53	6.4
	女性	12	4.7	24	9.6	35	17.9	19	16.4	90	11.0
	計	15	3.2	39	7.7	52	12.1	37	15.5	143	8.7
知人と会う	男性	21	9.6	29	11.4	53	22.6	29	23.6	132	15.9
	女性	47	18.3	53	21.3	72	36.9	39	33.6	211	25.8
	計	68	14.3	82	16.3	125	29.1	68	28.5	343	20.8
スポーツ以外の趣味・娯楽	男性	39	17.8	50	19.6	53	22.6	31	25.2	173	20.8
	女性	27	10.5	45	18.1	46	23.6	29	25.0	147	18.0
	計	66	13.9	95	18.8	99	23.1	60	25.1	320	19.4
スポーツ	男性	63	28.8	87	34.1	82	35.0	28	22.8	260	31.3
	女性	67	26.1	78	31.3	75	38.5	46	39.7	266	32.6
	計	130	27.3	165	32.7	157	36.6	74	31.0	526	31.9
デイサービス等	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	2.4	4	0.5
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	8	6.9	9	1.1
	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	11	4.6	13	0.8
その他	男性	3	1.4	22	8.6	44	18.8	26	21.1	95	11.4
	女性	22	8.6	33	13.3	20	10.3	16	13.8	91	11.1
	計	25	5.3	55	10.9	64	14.9	42	17.6	186	11.3

あまり外出しない理由（外出が週1回もしくはほとんど外出しない場合：複数回答）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
体に不自由があって歩行や外出がままならない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	2	13.3
	女性	0	0.0	0	0.0	1	20.0	5	38.5	6	23.1

	計	0	0.0	0	0.0	1	9.1	7	36.8	8	19.5
体力に自信がない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	50.0	3	20.0
	女性	1	33.3	1	20.0	1	20.0	3	23.1	6	23.1
	計	1	20.0	1	16.7	1	9.1	6	31.6	9	22.0
外出の必要がない	男性	1	50.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	3	20.0
	女性	2	66.7	1	20.0	3	60.0	8	61.5	14	53.8
	計	3	60.0	1	16.7	5	45.5	8	42.1	17	41.5
外出がおっくう	男性	0	0.0	0	0.0	2	33.3	2	33.3	4	26.7
	女性	1	33.3	2	40.0	2	40.0	2	15.4	7	26.9
	計	1	20.0	2	33.3	4	36.4	4	21.1	11	26.8
外出したい場所がない	男性	0	0.0	0	0.0	2	33.3	2	33.3	4	26.7
	女性	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	7.7
	計	1	20.0	0	0.0	2	18.2	3	15.8	6	14.6
自由に使えるお金がない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8
	計	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4
誘ってくれる人がいない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	2	13.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	2	4.9
その他	男性	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7
	女性	0	0.0	3	60.0	2	40.0	3	23.1	8	30.8
	計	1	20.0	3	50.0	2	18.2	3	15.8	9	22.0
特になし	男性	0	0.0	1	100.0	2	33.3	1	16.7	4	26.7
	女性	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8
	計	1	20.0	1	16.7	2	18.2	1	5.3	5	12.2

友達・近所の人あるいは別居家族や親戚と会って会話する頻度

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
毎日1回もしくはそれ以上	男性	189	85.5	141	55.1	97	40.4	34	26.4	461	54.5
	女性	159	61.2	120	47.2	64	32.0	31	24.0	374	44.4
	計	348	72.3	261	51.2	161	36.6	65	25.2	835	49.4
2～3日に1回程度	男性	22	10.0	67	26.2	80	33.3	45	34.9	214	25.3
	女性	68	26.2	85	33.5	77	38.5	66	51.2	296	35.1
	計	90	18.7	152	29.8	157	35.7	111	43.0	510	30.2
1週間に1回程度	男性	5	2.3	31	12.1	45	18.8	33	25.6	114	13.5
	女性	21	8.1	30	11.8	42	21.0	27	20.9	120	14.2
	計	26	5.4	61	12.0	87	19.8	60	23.3	234	13.9
1か月に1回程度	男性	1	0.5	9	3.5	12	5.0	11	8.5	33	3.9
	女性	10	3.8	12	4.7	15	7.5	5	3.9	42	5.0
	計	11	2.3	21	4.1	27	6.1	16	6.2	75	4.4
ほとんどない	男性	4	1.8	8	3.1	6	2.5	6	4.7	24	2.8
	女性	2	0.8	7	2.8	2	1.0	0	0.0	11	1.3
	計	6	1.2	15	2.9	8	1.8	6	2.3	35	2.1

外出するにあたっての介助の要否

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
必要	男性	3	1.4	1	0.4	2	0.8	5	3.9	11	1.3
	女性	1	0.4	0	0.0	1	0.5	7	5.4	9	1.1
	計	4	0.8	1	0.2	3	0.7	12	4.7	20	1.2
不要	男性	218	98.6	255	99.6	238	99.2	124	96.1	835	98.7
	女性	259	99.6	254	100.0	199	99.5	122	94.6	834	98.9
	計	477	99.2	509	99.8	437	99.3	246	95.3	1669	98.8

身体が不自由なため、外出して人に見られるのが恥ずかしいという気持ちがある

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ある	男性	1	0.5	3	1.2	1	0.4	1	0.8	6	0.7
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	2.3	4	0.5
	計	1	0.2	4	0.8	1	0.2	4	1.6	10	0.6
ない	男性	220	99.5	253	98.8	239	99.6	128	99.2	840	99.3
	女性	260	100.0	253	99.6	200	100.0	126	97.7	839	99.5
	計	480	99.8	506	99.2	439	99.8	254	98.4	1679	99.4

#### 5) 健康関連QOL尺度 (SF-36、身体機能)

SF-36：激しい活動、例えば一生けんめい走る、重い物を持ち上げる、激しいスポーツをするなど

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	15	6.8	28	10.9	49	20.4	61	47.3	153	18.1
	女性	21	8.1	53	20.9	68	34.0	68	52.7	210	24.9
	計	36	7.5	81	15.9	117	26.6	129	50.0	363	21.5
少し難しい	男性	66	29.9	115	44.9	124	51.7	61	47.3	366	43.3
	女性	113	43.5	112	44.1	114	57.0	50	38.8	389	46.1
	計	179	37.2	227	44.5	238	54.1	111	43.0	755	44.7
ぜんぜん難しくない	男性	140	63.3	113	44.1	67	27.9	7	5.4	327	38.7
	女性	126	48.5	89	35.0	18	9.0	11	8.5	244	28.9
	計	266	55.3	202	39.6	85	19.3	18	7.0	571	33.8

SF-36：適度の活動、例えば家や庭のそうじをする、1～2時間散歩するなど

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	1	0.4	3	1.3	5	3.9	9	1.1
	女性	0	0.0	0	0.0	3	1.5	11	8.5	14	1.7
	計	0	0.0	1	0.2	6	1.4	16	6.2	23	1.4
少し難しい	男性	9	4.1	12	4.7	23	9.6	39	30.2	83	9.8
	女性	11	4.2	29	11.4	31	15.5	32	24.8	103	12.2
	計	20	4.2	41	8.0	54	12.3	71	27.5	186	11.0
ぜんぜん難しくない	男性	212	95.9	243	94.9	214	89.2	85	65.9	754	89.1
	女性	249	95.8	225	88.6	166	83.0	86	66.7	726	86.1
	計	461	95.8	468	91.8	380	86.4	171	66.3	1480	87.6

SF-36：少し重い物を持ち上げたり、運んだりする（例えば買い物袋など）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	1	0.5	1	0.4	2	0.8	8	6.2	12	1.4
	女性	0	0.0	1	0.4	3	1.5	13	10.1	17	2.0
	計	1	0.2	2	0.4	5	1.1	21	8.1	29	1.7
少し難しい	男性	5	2.3	8	3.1	24	10.0	32	24.8	69	8.2
	女性	14	5.4	31	12.2	46	23.0	48	37.2	139	16.5
	計	19	4.0	39	7.6	70	15.9	80	31.0	208	12.3
ぜんぜん難しくない	男性	215	97.3	247	96.5	214	89.2	89	69.0	765	90.4
	女性	246	94.6	222	87.4	151	75.5	68	52.7	687	81.5
	計	461	95.8	469	92.0	365	83.0	157	60.9	1452	86.0

SF-36：階段を数階上までのぼる

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	1	0.4	5	2.1	14	10.9	20	2.4
	女性	3	1.2	7	2.8	7	3.5	17	13.2	34	4.0
	計	3	0.6	8	1.6	12	2.7	31	12.0	54	3.2
少し難しい	男性	10	4.5	24	9.4	39	16.3	43	33.3	116	13.7
	女性	24	9.2	41	16.1	58	29.0	53	41.1	176	20.9
	計	34	7.1	65	12.7	97	22.0	96	37.2	292	17.3
ぜんぜん難しくない	男性	211	95.5	231	90.2	196	81.7	72	55.8	710	83.9
	女性	233	89.6	206	81.1	135	67.5	59	45.7	633	75.1
	計	444	92.3	437	85.7	331	75.2	131	50.8	1343	79.5

SF-36：階段を1階上までのぼる

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	6	4.7	7	0.8
	女性	1	0.4	1	0.4	1	0.5	8	6.2	11	1.3
	計	1	0.2	1	0.2	2	0.5	14	5.4	18	1.1
少し難しい	男性	1	0.5	5	2.0	14	5.8	22	17.1	42	5.0
	女性	3	1.2	8	3.1	29	14.5	32	24.8	72	8.5
	計	4	0.8	13	2.5	43	9.8	54	20.9	114	6.7
ぜんぜん難しくない	男性	220	99.5	251	98.0	225	93.8	101	78.3	797	94.2
	女性	256	98.5	245	96.5	170	85.0	89	69.0	760	90.2
	計	476	99.0	496	97.3	395	89.8	190	73.6	1557	92.2

SF-36：体を前に曲げる、ひざまずく、かがむ

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.1

	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.1
とても難しい	男性	0	0.0	3	1.2	4	1.7	6	4.7	13	1.5
	女性	3	1.2	3	1.2	8	4.0	14	10.9	28	3.3
	計	3	0.6	6	1.2	12	2.7	20	7.8	41	2.4
少し難しい	男性	21	9.5	31	12.1	35	14.6	44	34.1	131	15.5
	女性	24	9.2	42	16.5	39	19.5	41	31.8	146	17.3
	計	45	9.4	73	14.3	74	16.8	85	32.9	277	16.4
ぜんぜん難しくない	男性	200	90.5	222	86.7	201	83.8	79	61.2	702	83.0
	女性	233	89.6	209	82.3	153	76.5	73	56.6	668	79.2
	計	433	90.0	431	84.5	354	80.5	152	58.9	1370	81.1

SF-36：1キロメートル以上歩く

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	1	0.5	3	1.2	3	1.3	16	12.4	23	2.7
	女性	1	0.4	6	2.4	11	5.5	16	12.4	34	4.0
	計	2	0.4	9	1.8	14	3.2	32	12.4	57	3.4
少し難しい	男性	8	3.6	17	6.6	29	12.1	28	21.7	82	9.7
	女性	15	5.8	35	13.8	42	21.0	40	31.0	132	15.7
	計	23	4.8	52	10.2	71	16.1	68	26.4	214	12.7
ぜんぜん難しくない	男性	212	95.9	236	92.2	208	86.7	85	65.9	741	87.6
	女性	244	93.8	213	83.9	147	73.5	73	56.6	677	80.3
	計	456	94.8	449	88.0	355	80.7	158	61.2	1418	84.0

SF-36：数百メートル以上歩く

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	3	1.3	7	5.4	10	1.2
	女性	1	0.4	0	0.0	2	1.0	9	7.0	12	1.4
	計	1	0.2	0	0.0	5	1.1	16	6.2	22	1.3
少し難しい	男性	2	0.9	9	3.5	6	2.5	16	12.4	33	3.9
	女性	1	0.4	14	5.5	18	9.0	19	14.7	52	6.2
	計	3	0.6	23	4.5	24	5.5	35	13.6	85	5.0
ぜんぜん難しくない	男性	219	99.1	247	96.5	231	96.3	106	82.2	803	94.9
	女性	258	99.2	240	94.5	180	90.0	101	78.3	779	92.4
	計	477	99.2	487	95.5	411	93.4	207	80.2	1582	93.7

SF-36：百メートル以上歩く

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	2	0.8	3	2.3	5	0.6
	女性	1	0.4	0	0.0	1	0.5	4	3.1	6	0.7
	計	1	0.2	0	0.0	3	0.7	7	2.7	11	0.7
少し難しい	男性	1	0.5	3	1.2	4	1.7	15	11.6	23	2.7
	女性	0	0.0	4	1.6	9	4.5	16	12.4	29	3.4
	計	1	0.2	7	1.4	13	3.0	31	12.0	52	3.1

ぜんぜん難しくない	男性	220	99.5	253	98.8	234	97.5	111	86.0	818	96.7
	女性	259	99.6	250	98.4	190	95.0	109	84.5	808	95.8
	計	479	99.6	503	98.6	424	96.4	220	85.3	1626	96.3

SF-36：自分でお風呂に入ったり、着がえたりする

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.1
少し難しい	男性	0	0.0	2	0.8	1	0.4	5	3.9	8	0.9
	女性	2	0.8	1	0.4	1	0.5	9	7.0	13	1.5
	計	2	0.4	3	0.6	2	0.5	14	5.4	21	1.2
ぜんぜん難しくない	男性	221	100.0	254	99.2	239	99.6	123	95.3	837	98.9
	女性	258	99.2	253	99.6	199	99.5	120	93.0	830	98.5
	計	479	99.6	507	99.4	438	99.5	243	94.2	1667	98.7

## 6) 要介護認定

要介護認定

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受けたことがない	男性	221	100.0	255	99.6	238	99.2	119	92.2	833	98.5
	女性	260	100.0	252	99.2	197	98.5	106	82.2	815	96.7
	計	481	100.0	507	99.4	435	98.9	225	87.2	1648	97.6
以前受けたが、現在は受けていない	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	3.1	5	0.6
	女性	0	0.0	1	0.4	2	1.0	4	3.1	7	0.8
	計	0	0.0	1	0.2	3	0.7	8	3.1	12	0.7
現在、受けている	男性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	6	4.7	8	0.9
	女性	0	0.0	1	0.4	1	0.5	19	14.7	21	2.5
	計	0	0.0	2	0.4	2	0.5	25	9.7	29	1.7

## 7) 運転

自動車・自動二輪車（バイク）の運転の現状

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
免許を取得したことがない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.3	3	0.4
	女性	4	1.5	14	5.5	29	14.5	39	30.2	86	10.2
	計	4	0.8	14	2.7	29	6.6	42	16.3	89	5.3
免許を保有し、現在運転している	男性	220	99.5	255	99.6	231	96.3	95	73.6	801	94.7
	女性	248	95.4	221	87.0	150	75.0	49	38.0	668	79.2
	計	468	97.3	476	93.3	381	86.6	144	55.8	1469	87.0
免許を保有している(いた)が、現在運転していない	男性	1	0.5	1	0.4	9	3.8	31	24.0	42	5.0
	女性	8	3.1	19	7.5	21	10.5	41	31.8	89	10.6
	計	9	1.9	20	3.9	30	6.8	72	27.9	131	7.8

主に運転している車両の種類（免許を保有し、現在運転している者のみ）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
自動車	男性	218	99.1	246	96.5	228	98.7	92	96.8	784	97.9
	女性	244	98.4	217	98.2	143	95.3	41	83.7	645	96.6
	計	462	98.7	463	97.3	371	97.4	133	92.4	1429	97.3
自動二輪車 （バイク）	男性	2	0.9	9	3.5	3	1.3	3	3.2	17	2.1
	女性	4	1.6	4	1.8	7	4.7	8	16.3	23	3.4
	計	6	1.3	13	2.7	10	2.6	11	7.6	40	2.7

運転頻度（免許を保有し、現在運転している者のみ；最近半年間）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ほぼ毎日	男性	141	64.1	176	69.0	154	66.7	53	55.8	524	65.4
	女性	183	73.8	135	61.1	79	52.7	19	38.8	416	62.3
	計	324	69.2	311	65.3	233	61.2	72	50.0	940	64.0
週に3～5回	男性	22	10.0	44	17.3	52	22.5	30	31.6	148	18.5
	女性	35	14.1	58	26.2	44	29.3	24	49.0	161	24.1
	計	57	12.2	102	21.4	96	25.2	54	37.5	309	21.0
週に1～2回	男性	48	21.8	32	12.5	19	8.2	9	9.5	108	13.5
	女性	26	10.5	19	8.6	21	14.0	5	10.2	71	10.6
	計	74	15.8	51	10.7	40	10.5	14	9.7	179	12.2
月に1～3回	男性	9	4.1	3	1.2	6	2.6	3	3.2	21	2.6
	女性	3	1.2	6	2.7	5	3.3	1	2.0	15	2.2
	計	12	2.6	9	1.9	11	2.9	4	2.8	36	2.5
年に1～数回	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.4	3	1.4	1	0.7	0	0.0	5	0.7
	計	1	0.2	3	0.6	1	0.3	0	0.0	5	0.3

運転をしていない年数（免許を保有している（いた）が、現在運転していない者のみ）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計						
		平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数			
男性		9.0	.	1	4.0	.	1	6.9	6.2	9	5.7	10.4	31	6.0	9.4	42
女性		19.5	10.4	8	19.9	14.8	19	9.5	11.8	21	14.4	13.6	41	14.9	13.5	89
計		18.3	10.3	9	19.2	14.8	20	8.7	10.4	30	10.7	13.0	72	12.0	13.0	131

4. 視覚

眼鏡・コンタクトレンズの使用

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	188	85.1	218	85.2	211	87.9	113	87.6	730	86.3
	女性	231	88.8	227	89.4	172	86.0	104	80.6	734	87.1
	計	419	87.1	445	87.3	383	87.0	217	84.1	1464	86.7

なし	男性	33	14.9	38	14.8	29	12.1	16	12.4	116	13.7
	女性	29	11.2	27	10.6	28	14.0	25	19.4	109	12.9
	計	62	12.9	65	12.7	57	13.0	41	15.9	225	13.3

眼鏡・コンタクトレンズの種類（眼鏡・コンタクトレンズ使用者のみ）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
遠用	男性	44	23.4	42	19.3	32	15.2	5	4.4	123	16.8
	女性	65	28.1	40	17.6	10	5.8	2	1.9	117	15.9
	計	109	26.0	82	18.4	42	11.0	7	3.2	240	16.4
近用（老眼用）	男性	51	27.1	42	19.3	62	29.4	30	26.5	185	25.3
	女性	63	27.3	76	33.5	63	36.6	39	37.5	241	32.8
	計	114	27.2	118	26.5	125	32.6	69	31.8	426	29.1
遠用と近用の両方 （遠近両用を含む）	男性	93	49.5	134	61.5	117	55.5	78	69.0	422	57.8
	女性	103	44.6	111	48.9	99	57.6	63	60.6	376	51.2
	計	196	46.8	245	55.1	216	56.4	141	65.0	798	54.5

視力を含めた見え具合の自己評価（眼鏡・コンタクトレンズを使用した状態で）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	1	0.2	2	0.5	0	0.0	3	0.2
とても良い	男性	14	6.3	11	4.3	14	5.8	10	7.8	49	5.8
	女性	7	2.7	11	4.3	6	3.0	2	1.6	26	3.1
	計	21	4.4	22	4.3	20	4.5	12	4.7	75	4.4
良い	男性	40	18.1	50	19.5	65	27.1	24	18.6	179	21.2
	女性	66	25.4	53	20.9	54	27.0	38	29.5	211	25.0
	計	106	22.0	103	20.2	119	27.0	62	24.0	390	23.1
普通	男性	134	60.6	166	64.8	139	57.9	85	65.9	524	61.9
	女性	155	59.6	174	68.5	119	59.5	79	61.2	527	62.5
	計	289	60.1	340	66.7	258	58.6	164	63.6	1051	62.2
悪い	男性	31	14.0	28	10.9	20	8.3	9	7.0	88	10.4
	女性	30	11.5	16	6.3	19	9.5	8	6.2	73	8.7
	計	61	12.7	44	8.6	39	8.9	17	6.6	161	9.5
とても悪い	男性	2	0.9	0	0.0	1	0.4	1	0.8	4	0.5
	女性	2	0.8	0	0.0	1	0.5	2	1.6	5	0.6
	計	4	0.8	0	0.0	2	0.5	3	1.2	9	0.5

5. 聴覚

補聴器の使用

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
よく使用している	男性	1	0.5	0	0.0	9	3.8	19	14.7	29	3.4
	女性	1	0.4	0	0.0	5	2.5	15	11.6	21	2.5

	計	2	0.4	0	0.0	14	3.2	34	13.2	50	3.0
ときどき使用している	男性	0	0.0	5	2.0	2	0.8	4	3.1	11	1.3
	女性	0	0.0	0	0.0	2	1.0	5	3.9	7	0.8
	計	0	0.0	5	1.0	4	0.9	9	3.5	18	1.1
持ってはいるが、使用していない	男性	2	0.9	0	0.0	4	1.7	7	5.4	13	1.5
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	2.3	4	0.5
	計	2	0.4	0	0.0	5	1.1	10	3.9	17	1.0
持っていない	男性	218	98.6	251	98.0	225	93.8	99	76.7	793	93.7
	女性	259	99.6	254	100.0	192	96.0	106	82.2	811	96.2
	計	477	99.2	505	99.0	417	94.8	205	79.5	1604	95.0

自分で聞こえが悪いと思う

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
思う	男性	9	4.1	30	11.7	46	19.2	35	27.1	120	14.2
	女性	15	5.8	16	6.3	27	13.5	32	24.8	90	10.7
	計	24	5.0	46	9.0	73	16.6	67	26.0	210	12.4
たまに思う	男性	64	29.0	100	39.1	85	35.4	42	32.6	291	34.4
	女性	83	31.9	88	34.6	91	45.5	59	45.7	321	38.1
	計	147	30.6	188	36.9	176	40.0	101	39.1	612	36.2
思わない	男性	148	67.0	126	49.2	109	45.4	52	40.3	435	51.4
	女性	162	62.3	150	59.1	82	41.0	38	29.5	432	51.2
	計	310	64.4	276	54.1	191	43.4	90	34.9	867	51.3

人から聞こえが悪いと言われたことがある

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
よくある	男性	3	1.4	14	5.5	29	12.1	24	18.6	70	8.3
	女性	3	1.2	8	3.1	10	5.0	18	14.0	39	4.6
	計	6	1.2	22	4.3	39	8.9	42	16.3	109	6.5
たまにある	男性	41	18.6	67	26.2	72	30.0	39	30.2	219	25.9
	女性	47	18.1	45	17.7	48	24.0	35	27.1	175	20.8
	計	88	18.3	112	22.0	120	27.3	74	28.7	394	23.3
ない	男性	177	80.1	175	68.4	139	57.9	66	51.2	557	65.8
	女性	210	80.8	201	79.1	142	71.0	76	58.9	629	74.6
	計	387	80.5	376	73.7	281	63.9	142	55.0	1186	70.2

職場での騒音（通常の会話が聞き取れない程度）がある

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
現在ある	男性	26	11.8	25	9.8	11	4.6	6	4.7	68	8.0
	女性	20	7.7	16	6.3	4	2.0	0	0.0	40	4.7
	計	46	9.6	41	8.0	15	3.4	6	2.3	108	6.4
以前あった	男性	14	6.3	31	12.1	41	17.1	17	13.2	103	12.2
	女性	8	3.1	10	3.9	12	6.0	14	10.9	44	5.2

	計	22	4.6	41	8.0	53	12.0	31	12.0	147	8.7
ない	男性	181	81.9	200	78.1	188	78.3	106	82.2	675	79.8
	女性	232	89.2	228	89.8	184	92.0	115	89.1	759	90.0
	計	413	85.9	428	83.9	372	84.5	221	85.7	1434	84.9

#### 耳鳴りの有無

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
常にある	男性	15	6.8	40	15.6	58	24.2	21	16.3	134	15.8
	女性	16	6.2	20	7.9	25	12.5	15	11.6	76	9.0
	計	31	6.4	60	11.8	83	18.9	36	14.0	210	12.4
たまにある	男性	32	14.5	56	21.9	50	20.8	26	20.2	164	19.4
	女性	67	25.8	54	21.3	40	20.0	24	18.6	185	21.9
	計	99	20.6	110	21.6	90	20.5	50	19.4	349	20.7
ない	男性	174	78.7	160	62.5	132	55.0	82	63.6	548	64.8
	女性	177	68.1	180	70.9	135	67.5	90	69.8	582	69.0
	計	351	73.0	340	66.7	267	60.7	172	66.7	1130	66.9

#### 耳鳴りの位置（耳鳴りのある者のみ：複数回答）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
右耳または頭の右側寄り	男性	18	38.3	29	30.2	27	25.0	11	23.4	85	28.5
	女性	22	26.5	14	18.9	19	29.2	10	25.6	65	24.9
	計	40	30.8	43	25.3	46	26.6	21	24.4	150	26.8
左耳または頭の左側寄り	男性	18	38.3	24	25.0	26	24.1	18	38.3	86	28.9
	女性	23	27.7	21	28.4	19	29.2	14	35.9	77	29.5
	計	41	31.5	45	26.5	45	26.0	32	37.2	163	29.2
正中（真ん中）または頭の中全体	男性	5	10.6	24	25.0	30	27.8	7	14.9	66	22.1
	女性	8	9.6	10	13.5	8	12.3	4	10.3	30	11.5
	計	13	10.0	34	20.0	38	22.0	11	12.8	96	17.2
位置はわからない	男性	18	38.3	30	31.3	36	33.3	15	31.9	99	33.2
	女性	39	47.0	37	50.0	29	44.6	14	35.9	119	45.6
	計	57	43.8	67	39.4	65	37.6	29	33.7	218	39.0

#### 耳鳴りがあるために、必要な音が聞き取りにくいと感じることがある（耳鳴りのある者のみ）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.2
よくある	男性	1	2.1	8	8.3	12	11.1	5	10.6	26	8.7
	女性	2	2.4	2	2.7	4	6.2	7	17.9	15	5.7
	計	3	2.3	10	5.9	16	9.2	12	14.0	41	7.3
たまにある	男性	13	27.7	26	27.1	31	28.7	15	31.9	85	28.5
	女性	14	16.9	6	8.1	16	24.6	16	41.0	52	19.9
	計	27	20.8	32	18.8	47	27.2	31	36.0	137	24.5

ない	男性	33	70.2	62	64.6	64	59.3	27	57.4	186	62.4
	女性	67	80.7	66	89.2	45	69.2	16	41.0	194	74.3
	計	100	76.9	128	75.3	109	63.0	43	50.0	380	68.0

耳鳴りがすると不快に思う（耳鳴りのある者のみ）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.2
たいへん不快に思う	男性	3	6.4	7	7.3	11	10.2	7	14.9	28	9.4
	女性	10	12.0	6	8.1	7	10.8	7	17.9	30	11.5
	計	13	10.0	13	7.6	18	10.4	14	16.3	58	10.4
まあまあ不快に思う	男性	30	63.8	40	41.7	38	35.2	16	34.0	124	41.6
	女性	41	49.4	38	51.4	30	46.2	15	38.5	124	47.5
	計	71	54.6	78	45.9	68	39.3	31	36.0	248	44.4
とくに思わない	男性	14	29.8	49	51.0	58	53.7	24	51.1	145	48.7
	女性	32	38.6	30	40.5	28	43.1	17	43.6	107	41.0
	計	46	35.4	79	46.5	86	49.7	41	47.7	252	45.1

6. 転倒

転倒恐怖感

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とてもこわい	男性	11	5.0	15	5.9	8	3.3	27	20.9	61	7.2
	女性	30	11.5	29	11.4	42	21.0	50	38.8	151	17.9
	計	41	8.5	44	8.6	50	11.4	77	29.8	212	12.6
少しこわい	男性	49	22.2	89	34.8	99	41.3	52	40.3	289	34.2
	女性	132	50.8	129	50.8	116	58.0	62	48.1	439	52.1
	計	181	37.6	218	42.7	215	48.9	114	44.2	728	43.1
こわくない	男性	161	72.9	152	59.4	133	55.4	50	38.8	496	58.6
	女性	98	37.7	96	37.8	42	21.0	17	13.2	253	30.0
	計	259	53.8	248	48.6	175	39.8	67	26.0	749	44.3

過去1年間の転倒経験

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	14	6.3	33	12.9	40	16.7	39	30.2	126	14.9
	女性	43	16.5	51	20.1	47	23.5	55	42.6	196	23.3
	計	57	11.9	84	16.5	87	19.8	94	36.4	322	19.1
なし	男性	207	93.7	223	87.1	200	83.3	90	69.8	720	85.1
	女性	217	83.5	203	79.9	153	76.5	74	57.4	647	76.7
	計	424	88.1	426	83.5	353	80.2	164	63.6	1367	80.9

## 過去1年間の転倒回数（転倒経験者のみ）

	50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	1.7	1.3	14	3.2	7.0	33	1.6	0.8	40	2.2	1.8	39	2.2	3.8	126
女性	1.3	0.8	43	1.5	1.1	51	2.4	3.8	47	1.8	1.1	55	1.8	2.1	196
計	1.4	1.0	57	2.2	4.5	84	2.0	2.8	87	2.0	1.4	94	1.9	2.9	322

## 7. 排尿

## 1) 排尿症状

## 床についてから朝起きるまでの排尿回数（最近1ヶ月間）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.1
まったくなし	男性	109	49.3	67	26.2	30	12.5	7	5.4	213	25.2
	女性	147	56.5	93	36.6	40	20.0	17	13.2	297	35.2
	計	256	53.2	160	31.4	70	15.9	24	9.3	510	30.2
1回	男性	92	41.6	132	51.6	85	35.4	37	28.7	346	40.9
	女性	91	35.0	118	46.5	101	50.5	37	28.7	347	41.2
	計	183	38.0	250	49.0	186	42.3	74	28.7	693	41.0
2回	男性	11	5.0	43	16.8	87	36.3	43	33.3	184	21.7
	女性	11	4.2	31	12.2	43	21.5	54	41.9	139	16.5
	計	22	4.6	74	14.5	130	29.5	97	37.6	323	19.1
3回	男性	6	2.7	12	4.7	29	12.1	32	24.8	79	9.3
	女性	5	1.9	8	3.1	12	6.0	16	12.4	41	4.9
	計	11	2.3	20	3.9	41	9.3	48	18.6	120	7.1
4回	男性	2	0.9	1	0.4	6	2.5	7	5.4	16	1.9
	女性	1	0.4	2	0.8	4	2.0	4	3.1	11	1.3
	計	3	0.6	3	0.6	10	2.3	11	4.3	27	1.6
5回以上	男性	1	0.5	1	0.4	2	0.8	3	2.3	7	0.8
	女性	4	1.5	2	0.8	0	0.0	1	0.8	7	0.8
	計	5	1.0	3	0.6	2	0.5	4	1.6	14	0.8

## 2) 尿失禁

## 尿漏れ経験

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
あり	男性	13	5.9	40	15.6	55	22.9	39	30.2	147	17.4
	女性	114	43.8	146	57.5	115	57.5	63	48.8	438	52.0
	計	127	26.4	186	36.5	170	38.6	102	39.5	585	34.6

なし	男性	208	94.1	216	84.4	185	77.1	90	69.8	699	82.6
	女性	145	55.8	108	42.5	85	42.5	66	51.2	404	47.9
	計	353	73.4	324	63.5	270	61.4	156	60.5	1103	65.3

現在の尿漏れ（尿漏れ経験のある者のみ）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	10	76.9	28	70.0	39	70.9	31	79.5	108	73.5
	女性	69	60.5	96	65.8	80	69.6	54	85.7	299	68.3
	計	79	62.2	124	66.7	119	70.0	85	83.3	407	69.6
なし	男性	3	23.1	12	30.0	16	29.1	8	20.5	39	26.5
	女性	45	39.5	50	34.2	35	30.4	9	14.3	139	31.7
	計	48	37.8	62	33.3	51	30.0	17	16.7	178	30.4

尿漏れの頻度（現在、尿漏れのある者のみ）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
およそ1週間に1回、 あるいはそれ以下	男性	9	90.0	15	53.6	18	46.2	20	64.5	62	57.4
	女性	56	81.2	65	67.7	51	63.8	27	50.0	199	66.6
	計	65	82.3	80	64.5	69	58.0	47	55.3	261	64.1
1週間に2～3回	男性	1	10.0	7	25.0	12	30.8	4	12.9	24	22.2
	女性	7	10.1	19	19.8	11	13.8	17	31.5	54	18.1
	計	8	10.1	26	21.0	23	19.3	21	24.7	78	19.2
およそ1日に1回	男性	0	0.0	5	17.9	3	7.7	2	6.5	10	9.3
	女性	4	5.8	4	4.2	10	12.5	7	13.0	25	8.4
	計	4	5.1	9	7.3	13	10.9	9	10.6	35	8.6
1日に数回	男性	0	0.0	1	3.6	6	15.4	2	6.5	9	8.3
	女性	2	2.9	7	7.3	8	10.0	2	3.7	19	6.4
	計	2	2.5	8	6.5	14	11.8	4	4.7	28	6.9
常に	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	9.7	3	2.8
	女性	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.9	2	0.7
	計	0	0.0	1	0.8	0	0.0	4	4.7	5	1.2

尿漏れの機会（現在、尿漏れのある者のみ：複数回答）

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
トイレにたどり着く 前にもれる	男性	3	30.0	19	67.9	27	69.2	21	67.7	70	64.8
	女性	17	24.6	35	36.5	35	43.8	32	59.3	119	39.8
	計	20	25.3	54	43.5	62	52.1	53	62.4	189	46.4
せきやくしゃみをした 時にもれる	男性	1	10.0	2	7.1	3	7.7	5	16.1	11	10.2
	女性	55	79.7	77	80.2	56	70.0	32	59.3	220	73.6
	計	56	70.9	79	63.7	59	49.6	37	43.5	231	56.8
眠っている間にも れる	男性	0	0.0	1	3.6	2	5.1	3	9.7	6	5.6
	女性	3	4.3	1	1.0	0	0.0	2	3.7	6	2.0
	計	3	3.8	2	1.6	2	1.7	5	5.9	12	2.9
身体を動かしている	男性	2	20.0	1	3.6	0	0.0	5	16.1	8	7.4

時や運動している時にもれる	女性	17	24.6	21	21.9	9	11.3	5	9.3	52	17.4
	計	19	24.1	22	17.7	9	7.6	10	11.8	60	14.7
排尿を終えて服を着た時にもれる	男性	7	70.0	11	39.3	10	25.6	6	19.4	34	31.5
	女性	2	2.9	5	5.2	1	1.3	2	3.7	10	3.3
	計	9	11.4	16	12.9	11	9.2	8	9.4	44	10.8
理由がわからずにもれる	男性	0	0.0	1	3.6	2	5.1	5	16.1	8	7.4
	女性	2	2.9	3	3.1	3	3.8	5	9.3	13	4.3
	計	2	2.5	4	3.2	5	4.2	10	11.8	21	5.2
常にもれている	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	0.3
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	0.2
その他	男性	1	10.0	3	10.7	2	5.1	2	6.5	8	7.4
	女性	2	2.9	6	6.3	5	6.3	7	13.0	20	6.7
	計	3	3.8	9	7.3	7	5.9	9	10.6	28	6.9

## 8. フレイル

### 1) 簡易フレイル・インデックス (Yamada and Arai (2015))

#### 簡易フレイル・インデックス：体重減少

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
該当	男性	29	13.1	27	10.5	17	7.1	12	9.3	85	10.0
	女性	29	11.2	20	7.9	17	8.5	15	11.6	81	9.6
	計	58	12.1	47	9.2	34	7.7	27	10.5	166	9.8
非該当	男性	192	86.9	229	89.5	223	92.9	117	90.7	761	90.0
	女性	231	88.8	234	92.1	183	91.5	114	88.4	762	90.4
	計	423	87.9	463	90.8	406	92.3	231	89.5	1523	90.2

#### 簡易フレイル・インデックス：歩行速度低下

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
該当	男性	60	27.1	94	36.7	101	42.1	88	68.2	343	40.5
	女性	69	26.5	106	41.7	112	56.0	97	75.2	384	45.6
	計	129	26.8	200	39.2	213	48.4	185	71.7	727	43.0
非該当	男性	161	72.9	162	63.3	139	57.9	41	31.8	503	59.5
	女性	191	73.5	148	58.3	88	44.0	32	24.8	459	54.4
	計	352	73.2	310	60.8	227	51.6	73	28.3	962	57.0

#### 簡易フレイル・インデックス：低身体活動量

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
該当	男性	104	47.1	85	33.2	64	26.7	40	31.0	293	34.6
	女性	146	56.2	114	44.9	63	31.5	45	34.9	368	43.7
	計	250	52.0	199	39.0	127	28.9	85	32.9	661	39.1
非該当	男性	117	52.9	171	66.8	176	73.3	89	69.0	553	65.4

女性	114	43.8	140	55.1	137	68.5	84	65.1	475	56.3
計	231	48.0	311	61.0	313	71.1	173	67.1	1028	60.9

簡易フレイル・インデックス：記憶力低下

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
該当	男性	4	1.8	2	0.8	9	3.8	14	10.9	29	3.4
	女性	1	0.4	2	0.8	5	2.5	8	6.2	16	1.9
	計	5	1.0	4	0.8	14	3.2	22	8.5	45	2.7
非該当	男性	217	98.2	254	99.2	231	96.3	115	89.1	817	96.6
	女性	259	99.6	252	99.2	195	97.5	121	93.8	827	98.1
	計	476	99.0	506	99.2	426	96.8	236	91.5	1644	97.3

簡易フレイル・インデックス：疲労感

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
該当	男性	22	10.0	21	8.2	18	7.5	22	17.1	83	9.8
	女性	34	13.1	39	15.4	37	18.5	26	20.2	136	16.1
	計	56	11.6	60	11.8	55	12.5	48	18.6	219	13.0
非該当	男性	199	90.0	235	91.8	222	92.5	107	82.9	763	90.2
	女性	226	86.9	215	84.6	163	81.5	103	79.8	707	83.9
	計	425	88.4	450	88.2	385	87.5	210	81.4	1470	87.0

フレイル判定

※上記5項目中いずれも該当しない者をロバスト、1～2項目該当する者をプレフレイル、3項目以上該当する者をフレイルとした

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ロバスト	男性	75	33.9	98	38.3	103	42.9	28	21.7	304	35.9
	女性	67	25.8	72	28.3	56	28.0	21	16.3	216	25.6
	計	142	29.5	170	33.3	159	36.1	49	19.0	520	30.8
プレフレイル	男性	133	60.2	147	57.4	123	51.3	83	64.3	486	57.4
	女性	176	67.7	166	65.4	124	62.0	90	69.8	556	66.0
	計	309	64.2	313	61.4	247	56.1	173	67.1	1042	61.7
フレイル	男性	13	5.9	11	4.3	14	5.8	18	14.0	56	6.6
	女性	17	6.5	16	6.3	20	10.0	18	14.0	71	8.4
	計	30	6.2	27	5.3	34	7.7	36	14.0	127	7.5

2) 社会的フレイル (Makizako, et al. (2018))

社会的フレイル：独居である

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
該当	男性	10	4.5	15	5.9	10	4.2	8	6.2	43	5.1
	女性	12	4.6	14	5.5	38	19.0	41	31.8	105	12.5
	計	22	4.6	29	5.7	48	10.9	49	19.0	148	8.8

非該当	男性	211	95.5	241	94.1	230	95.8	121	93.8	803	94.9
	女性	248	95.4	240	94.5	162	81.0	88	68.2	738	87.5
	計	459	95.4	481	94.3	392	89.1	209	81.0	1541	91.2

社会的フレイル：昨年と比べて外出頻度が減っている

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
該当	男性	42	19.0	58	22.7	54	22.5	30	23.3	184	21.7
	女性	59	22.7	82	32.3	68	34.0	55	42.6	264	31.3
	計	101	21.0	140	27.5	122	27.7	85	32.9	448	26.5
非該当	男性	179	81.0	198	77.3	186	77.5	99	76.7	662	78.3
	女性	201	77.3	172	67.7	132	66.0	74	57.4	579	68.7
	計	380	79.0	370	72.5	318	72.3	173	67.1	1241	73.5

社会的フレイル：友人の家を訪ねることがない

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
該当	男性	188	85.1	181	70.7	143	59.6	71	55.0	583	68.9
	女性	193	74.2	154	60.6	94	47.0	55	42.6	496	58.8
	計	381	79.2	335	65.7	237	53.9	126	48.8	1079	63.9
非該当	男性	33	14.9	75	29.3	97	40.4	58	45.0	263	31.1
	女性	67	25.8	100	39.4	106	53.0	74	57.4	347	41.2
	計	100	20.8	175	34.3	203	46.1	132	51.2	610	36.1

社会的フレイル：家族や友人の役に立っていると思わない

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
該当	男性	9	4.1	16	6.3	13	5.4	20	15.5	58	6.9
	女性	8	3.1	9	3.5	16	8.0	19	14.7	52	6.2
	計	17	3.5	25	4.9	29	6.6	39	15.1	110	6.5
非該当	男性	212	95.9	240	93.8	227	94.6	109	84.5	788	93.1
	女性	252	96.9	245	96.5	184	92.0	110	85.3	791	93.8
	計	464	96.5	485	95.1	411	93.4	219	84.9	1579	93.5

社会的フレイル：誰とも話さない日がある

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
該当	男性	4	1.8	11	4.3	12	5.0	13	10.1	40	4.7
	女性	3	1.2	14	5.5	15	7.5	23	17.8	55	6.5
	計	7	1.5	25	4.9	27	6.1	36	14.0	95	5.6
非該当	男性	217	98.2	245	95.7	228	95.0	116	89.9	806	95.3
	女性	257	98.8	240	94.5	185	92.5	106	82.2	788	93.5
	計	474	98.5	485	95.1	413	93.9	222	86.0	1594	94.4

社会的フレイル判定

※上記5項目中いずれも該当しない者を社会的ロバスト、1項目該当する者を社会的プレフレイル、2項目以上該当する者を社会的フレイルとした

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
社会的ロバスト	男性	27	12.2	59	23.0	76	31.7	42	32.6	204	24.1
	女性	57	21.9	73	28.7	63	31.5	38	29.5	231	27.4
	計	84	17.5	132	25.9	139	31.6	80	31.0	435	25.8
社会的プレフレイル	男性	145	65.6	131	51.2	111	46.3	50	38.8	437	51.7
	女性	137	52.7	102	40.2	71	35.5	36	27.9	346	41.0
	計	282	58.6	233	45.7	182	41.4	86	33.3	783	46.4
社会的フレイル	男性	49	22.2	66	25.8	53	22.1	37	28.7	205	24.2
	女性	66	25.4	79	31.1	66	33.0	55	42.6	266	31.6
	計	115	23.9	145	28.4	119	27.0	92	35.7	471	27.9

9. エジンバラ利き手検査

ラテラルティ指数 (LQ: Oldfield (1971) に基づき算出)

※ 範囲は-100 (完全な左利き) ~100 (完全な右利き) で、0は完全な両手利きとされる

	50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	77.5	36.0	221	80.7	29.1	256	79.9	30.0	240	82.1	31.7	129	79.8	31.6	846
女性	82.8	29.6	260	82.1	29.2	254	82.6	27.0	200	87.6	17.7	128	83.3	27.4	842
計	80.4	32.8	481	81.4	29.1	510	81.1	28.7	440	84.8	25.8	257	81.6	29.6	1688

ラテラルティ指数 (LQ) 分類

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
-100 ~ -61	男性	4	1.8	0	0.0	1	0.4	0	0.0	5	0.6
	女性	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	計	5	1.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	7	0.4
-60 ~ 60	男性	22	10.0	24	9.4	23	9.6	13	10.1	82	9.7
	女性	24	9.2	17	6.7	13	6.5	4	3.1	58	6.9
	計	46	9.6	41	8.0	36	8.2	17	6.6	140	8.3
61 ~ 100	男性	195	88.2	232	90.6	216	90.0	116	89.9	759	89.7
	女性	235	90.4	236	92.9	187	93.5	124	96.9	782	92.9
	計	430	89.4	468	91.8	403	91.6	240	93.4	1541	91.3