

III. 服用薬物調査

過去2週間に使用したすべての処方薬及び市販薬をコード化している。

※コードは、日本標準商品分類番号に従い、医薬品を表す87以降の薬効分類番号3桁とした。
なお、4桁目以降の数字は、NLS-LSA独自のコードである。

神経系及び感覚器官用医薬品

中枢神経系用薬

- 111 全身麻酔薬
- 112 催眠鎮静剤、抗不安剤
- 113 抗てんかん剤
- 114 解熱鎮痛消炎剤
- 115 興奮剤、覚せい剤
- 116 抗パーキンソン剤
- 117 精神神経用剤
- 118 総合感冒剤
- 119 その他の中枢神経系用薬

末梢神経系用薬

- 121 局所麻酔薬
- 122 骨格筋弛緩剤
- 123 自律神経剤
- 124 鎮けい剤
- 125 発汗剤、止汗剤
- 129 その他の末梢神経系用薬

感覚器官用薬

- 13100 眼科用剤（その他）
- 13111 眼科用剤（白内障）
- 13121 眼科用剤（ピロカルピン）
- 13122 眼科用剤（βブロッカー）
- 13123 眼科用剤（エピネフリン）
- 13124 眼科用剤（その他の緑内障用薬）
- 13131 眼科用剤（ステロイド）
- 13199 不明の眼科用剤
- 132 耳鼻科用剤
- 133 鎮うん剤
- 139 その他の感覚器官用薬

個々の器官系用医薬品

循環器官用剤

- 21101 ジギタリス製剤
- 21102 キサンチン製剤
- 21103 その他の強心剤
- 21201 βブロッカー
- 21202 膜安定化薬
- 21203 その他の抗不整脈薬
- 21301 サイアサイド利尿薬
- 21302 ループ利尿薬
- 21303 K保持性利尿薬
- 21304 炭酸脱水酵素（Carbonic Anhydrase）抑制薬
- 21305 その他の利尿薬
- 214 不明の降圧剤
- 21401 ACE阻害薬
- 21402 Ca拮抗薬
- 21403 その他の降圧薬
- 215 血管補強剤
- 216 血管収縮剤
- 217 血管拡張剤
- 218 高脂血症用剤
- 219 その他の循環器官用薬

呼吸器官用薬

- 221 呼吸促進剤
- 222 鎮咳剤
- 223 去たん剤
- 224 鎮咳去たん剤
- 225 気管支拡張剤
- 226 含そう剤
- 229 その他の呼吸器官用薬

消化器官用薬

- 231 止しゃ剤、整腸剤
- 232 消化性潰瘍用剤
- 233 健胃消化剤
- 234 制酸剤
- 235 下剤、瀉腸剤
- 236 利胆剤
- 237 複合胃腸剤
- 239 その他の消化器官用薬

ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

- 241 脳下垂体ホルモン剤
- 242 唾液腺ホルモン剤
- 243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
- 244 タンパク同化ステロイド剤
- 245 副腎ホルモン剤
- 246 男性ホルモン剤
- 247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
- 248 混合ホルモン剤
- 249 その他のホルモン剤

泌尿生殖器官及び肛門用薬

- 251 泌尿器官用剤
- 252 生殖器官用剤
- 253 子宮収縮剤
- 254 避妊剤
- 255 痔疾用剤
- 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

外皮用薬

- 261 外皮用殺菌消毒剤
- 262 創傷保護剤
- 263 化膿性疾患用剤
- 264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤
- 265 寄生性皮膚疾患用剤
- 266 皮膚軟化剤
- 267 毛髪用剤
- 268 浴剤
- 269 その他の外皮用剤

歯科口腔用薬

- 270 ステロイド系外皮用剤
- 271 歯科用局所麻酔剤
- 272 歯髄失活剤
- 273 歯科用鎮痛鎮静剤
- 274 歯髄乾屍剤
- 275 歯髄覆たく剤
- 276 歯科用抗生物質製剤
- 279 その他の歯科口腔用薬

代謝性医薬品

ビタミン剤

- 31101 ビタミンA剤
- 31102 ビタミンD剤
- 312 ビタミンB1剤
- 313 ビタミンB剤 (B1除く)
- 314 ビタミンC剤
- 315 ビタミンE剤
- 316 ビタミンK剤
- 317 混合ビタミン剤
- 319 その他のビタミン剤

滋養強壮薬

- 321 カルシウム剤
- 322 無機質製剤
- 323 糖類剤
- 324 有機酸製剤
- 325 タンパクアミノ酸製剤
- 326 臓器製剤
- 327 乳幼児用剤
- 329 その他の滋養強壮薬

血液・体液用薬

- 331 血液代用剤
- 332 止血剤
- 333 血液凝固阻止剤
- 339 その他の血液・体液用薬

人工透析用薬

- 341 人工腎臓透析用剤
- 342 腹膜透析用剤
- 349 その他の人工透析用薬

その他の代謝性医薬品

- 391 肝臓疾患用剤
- 392 解毒剤
- 393 習慣性中毒用剤
- 394 痛風治療剤
- 395 酵素製剤
- 39600 インスリン
- 39601 経口糖尿病薬
- 397 総合代謝性製剤
- 399 他に分類されない代謝性医薬品
- 39911 カルシトニン製剤 (エルカトニン)
- 39912 カルシトニン製剤 (サケカルシトニン)
- 39921 ビスホスホネート系 (アレンドロン酸ナトリウム水和物)
- 39922 ビスホスホネート系 (リセドロン酸ナトリウム水和物)
- 39923 ビスホスホネート系 (エチドロン酸二ナトリウム)
- 39924 ビスホスホネート系 (ミノドロロン酸水和物)
- 39931 イブリフラボン
- 39941 選択的エストロゲン受容体モジュレーター

組織細胞機能用医薬品

細胞賦活用薬

- 411 クロロフィル製剤
- 412 色素製剤
- 419 その他の細胞賦活用薬

腫瘍用薬

- 421 アルキル化剤
- 422 代謝拮抗剤
- 423 抗腫瘍性抗生物質製剤
- 424 抗腫瘍性植物成分製剤
- 429 その他の腫瘍用薬

アレルギー用薬

- 441 抗ヒスタミン剤
- 442 刺激療法剤
- 443 非特異性免疫原製剤
- 449 その他のアレルギー用薬

生薬及び漢方処方に基づく医薬品

- 510 生薬
- 520 漢方製剤

590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

病原生物に対する医薬品

抗生物質製剤

- 611 主としてグラム陽性菌に作用する抗生物質
- 612 主としてグラム陰性菌に作用する抗生物質
- 613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する抗生物質
- 614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用する抗生物質
- 615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用する抗生物質
- 616 主として抗酸菌に作用する抗生物質
- 617 主としてカビに作用する抗生物質
- 619 その他の抗生物質製剤

化学療法剤

- 621 サルファ剤
- 622 抗結核剤
- 623 治らい剤
- 624 合成抗菌剤
- 625 抗ウイルス剤
- 629 その他の化学療法剤

生物学的製剤

- 631 ワクチン類
- 632 毒素及びトキソイド類
- 633 抗毒素類及びレプトスピラ血清類
- 634 血液製剤類
- 635 生物学的試験用製剤類
- 636 混合生物学的製剤
- 639 その他の生物学的製剤

寄生動物用薬

- 641 抗原虫剤
- 642 駆虫剤
- 649 その他の寄生動物に対する医薬品

治療を主目的としない医薬品

調剤用薬

- 711 賦形剤
- 712 軟膏基剤
- 713 溶解剤
- 714 矯味、矯臭、着色剤
- 715 乳化剤
- 719 その他の調剤用薬

診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

- 721 X線造影剤
- 722 機能検査用試薬
- 729 その他の診断用薬

公衆衛生用薬

- 731 防腐剤
- 732 防疫用殺菌消毒剤
- 733 防虫剤
- 734 殺虫剤
- 735 殺そ剤
- 739 その他の公衆衛生用薬

体外診断用医薬品

- 741 一般検査用試薬
- 742 血液検査用試薬
- 743 生化学的検査用試薬
- 744 免疫血清学的検査用試薬
- 745 細菌学的検査用薬
- 746 病理組織検査用薬
- 747 体外診断用放射性医薬品
- 749 その他の体外診断用医薬品

その他の治療を主目的としない医薬品

- 791 絆創膏
- 799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

麻薬

アルカロイド系麻薬（天然麻薬）

- 811 アヘンアルカロイド系製剤
- 812 コカアルカロイド系製剤
- 819 その他のアルカロイド系麻薬

非アルカロイド系麻薬

- 821 合成麻薬

分類不能の薬品

- 999 分類不能の薬品

服薬調査（過去2週間の使用薬物）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		全身麻酔薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
催眠鎮静剤、抗不安剤	男性	8	3.0	6	2.3	10	3.5	29	11.1	9	9.1	62	5.3

	女性	4	1.4	7	2.7	20	7.5	41	16.7	24	22.9	96	8.3
	計	12	2.2	13	2.5	30	5.5	70	13.8	33	16.2	158	6.8
抗てんかん剤	男性	1	0.4	1	0.4	0	0.0	7	2.7	1	1.0	10	0.8
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.8	1	0.4	1	1.0	5	0.4
	計	1	0.2	2	0.4	2	0.4	8	1.6	2	1.0	15	0.6
解熱鎮痛消炎剤	男性	37	13.8	34	12.8	32	11.3	60	22.9	24	24.2	187	15.9
	女性	59	21.4	42	16.2	34	12.8	57	23.2	30	28.6	222	19.3
	計	96	17.6	76	14.5	66	12.0	117	23.0	54	26.5	409	17.6
興奮剤、覚せい剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
抗パーキンソン剤	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.8	1	1.0	4	0.3
	女性	1	0.4	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.3
	計	1	0.2	2	0.4	1	0.2	2	0.4	1	0.5	7	0.3
精神神経用剤	男性	11	4.1	6	2.3	5	1.8	10	3.8	4	4.0	36	3.1
	女性	5	1.8	6	2.3	12	4.5	24	9.8	10	9.5	57	4.9
	計	16	2.9	12	2.3	17	3.1	34	6.7	14	6.9	93	4.0
総合感冒剤	男性	21	7.8	17	6.4	12	4.2	8	3.1	2	2.0	60	5.1
	女性	21	7.6	19	7.3	14	5.3	16	6.5	2	1.9	72	6.3
	計	42	7.7	36	6.9	26	4.7	24	4.7	4	2.0	132	5.7
その他の中枢神経系用薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.0	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	2	0.8	1	0.4	1	1.0	4	0.3
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.4	2	1.0	6	0.3
局所麻酔薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
骨格筋弛緩剤	男性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.1
自律神経剤	男性	1	0.4	2	0.8	1	0.4	1	0.4	2	2.0	7	0.6
	女性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	計	1	0.2	3	0.6	2	0.4	1	0.2	2	1.0	9	0.4
鎮けい剤	男性	2	0.7	3	1.1	3	1.1	5	1.9	1	1.0	14	1.2
	女性	0	0.0	2	0.8	3	1.1	4	1.6	0	0.0	9	0.8
	計	2	0.4	5	1.0	6	1.1	9	1.8	1	0.5	23	1.0
発汗剤、止汗剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の末梢神経系用薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
眼科用剤（その他）	男性	57	21.3	64	24.2	73	25.7	58	22.1	29	29.3	281	23.9
	女性	49	17.8	48	18.5	81	30.6	83	33.7	41	39.0	302	26.2
	計	106	19.5	112	21.3	154	28.1	141	27.8	70	34.3	583	25.0
眼科用剤（白内障）	男性	0	0.0	3	1.1	11	3.9	31	11.8	7	7.1	52	4.4
	女性	1	0.4	8	3.1	25	9.4	26	10.6	18	17.1	78	6.8
	計	1	0.2	11	2.1	36	6.6	57	11.2	25	12.3	130	5.6
眼科用剤（ピロカルピン）	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.5	2	0.1
眼科用剤（βブロッカー）	男性	2	0.7	2	0.8	7	2.5	3	1.1	9	9.1	23	2.0
	女性	1	0.4	4	1.5	6	2.3	4	1.6	7	6.7	22	1.9

	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の利尿薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
不明の降圧剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ACE阻害薬	男性	9	3.4	42	15.8	71	25.0	65	24.8	34	34.3	221	18.8
	女性	1	0.4	21	8.1	50	18.9	53	21.5	44	41.9	169	14.7
	計	10	1.8	63	12.0	121	22.0	118	23.2	78	38.2	390	16.7
Ca拮抗薬	男性	6	2.2	36	13.6	72	25.4	82	31.3	35	35.4	231	19.6
	女性	1	0.4	22	8.5	35	13.2	82	33.3	47	44.8	187	16.2
	計	7	1.3	58	11.0	107	19.5	164	32.3	82	40.2	418	17.9
その他の降圧薬	男性	0	0.0	3	1.1	5	1.8	6	2.3	4	4.0	18	1.5
	女性	0	0.0	2	0.8	1	0.4	3	1.2	4	3.8	10	0.9
	計	0	0.0	5	1.0	6	1.1	9	1.8	8	3.9	28	1.2
血管補強剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
血管収縮剤	男性	1	0.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	3	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	1	0.2	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.1
血管拡張剤	男性	1	0.4	2	0.8	3	1.1	14	5.3	11	11.1	31	2.6
	女性	0	0.0	1	0.4	3	1.1	11	4.5	9	8.6	24	2.1
	計	1	0.2	3	0.6	6	1.1	25	4.9	20	9.8	55	2.4
高脂血症用剤	男性	15	5.6	29	10.9	54	19.0	51	19.5	22	22.2	171	14.5
	女性	3	1.1	38	14.6	79	29.8	77	31.3	41	39.0	238	20.7
	計	18	3.3	67	12.8	133	24.2	128	25.2	63	30.9	409	17.6
その他の循環器官用薬	男性	0	0.0	1	0.4	5	1.8	12	4.6	8	8.1	26	2.2
	女性	2	0.7	4	1.5	6	2.3	12	4.9	5	4.8	29	2.5
	計	2	0.4	5	1.0	11	2.0	24	4.7	13	6.4	55	2.4
呼吸促進剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
鎮咳剤	男性	4	1.5	1	0.4	1	0.4	3	1.1	1	1.0	10	0.8
	女性	5	1.8	3	1.2	5	1.9	3	1.2	2	1.9	18	1.6
	計	9	1.7	4	0.8	6	1.1	6	1.2	3	1.5	28	1.2
去たん剤	男性	8	3.0	1	0.4	7	2.5	7	2.7	2	2.0	25	2.1
	女性	5	1.8	5	1.9	8	3.0	8	3.3	6	5.7	32	2.8
	計	13	2.4	6	1.1	15	2.7	15	3.0	8	3.9	57	2.4
鎮咳去たん剤	男性	4	1.5	4	1.5	1	0.4	6	2.3	2	2.0	17	1.4
	女性	4	1.4	5	1.9	0	0.0	3	1.2	1	1.0	13	1.1
	計	8	1.5	9	1.7	1	0.2	9	1.8	3	1.5	30	1.3
気管支拡張剤	男性	0	0.0	3	1.1	5	1.8	6	2.3	3	3.0	17	1.4
	女性	3	1.1	1	0.4	1	0.4	2	0.8	1	1.0	8	0.7
	計	3	0.6	4	0.8	6	1.1	8	1.6	4	2.0	25	1.1
含そう剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の呼吸器官用薬	男性	0	0.0	3	1.1	0	0.0	3	1.1	1	1.0	7	0.6
	女性	2	0.7	0	0.0	3	1.1	1	0.4	0	0.0	6	0.5
	計	2	0.4	3	0.6	3	0.5	4	0.8	1	0.5	13	0.6

止しゃ剤、整腸剤	男性	6	2.2	6	2.3	3	1.1	10	3.8	4	4.0	29	2.5
	女性	4	1.4	6	2.3	6	2.3	10	4.1	8	7.6	34	3.0
	計	10	1.8	12	2.3	9	1.6	20	3.9	12	5.9	63	2.7
消化性潰瘍用剤	男性	21	7.8	28	10.6	28	9.9	72	27.5	30	30.3	179	15.2
	女性	17	6.2	20	7.7	32	12.1	63	25.6	47	44.8	179	15.5
	計	38	7.0	48	9.1	60	10.9	135	26.6	77	37.7	358	15.4
健胃消化剤	男性	0	0.0	1	0.4	4	1.4	4	1.5	4	4.0	13	1.1
	女性	2	0.7	1	0.4	1	0.4	2	0.8	3	2.9	9	0.8
	計	2	0.4	2	0.4	5	0.9	6	1.2	7	3.4	22	0.9
制酸剤	男性	1	0.4	1	0.4	1	0.4	2	0.8	2	2.0	7	0.6
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	1.2	1	1.0	5	0.4
	計	2	0.4	1	0.2	1	0.2	5	1.0	3	1.5	12	0.5
下剤、浣腸剤	男性	2	0.7	1	0.4	5	1.8	17	6.5	15	15.2	40	3.4
	女性	9	3.3	11	4.2	10	3.8	30	12.2	14	13.3	74	6.4
	計	11	2.0	12	2.3	15	2.7	47	9.3	29	14.2	114	4.9
利胆剤	男性	1	0.4	3	1.1	4	1.4	8	3.1	5	5.1	21	1.8
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.2
	計	1	0.2	4	0.8	4	0.7	9	1.8	5	2.5	23	1.0
複合胃腸剤	男性	11	4.1	9	3.4	9	3.2	9	3.4	0	0.0	38	3.2
	女性	7	2.5	2	0.8	8	3.0	5	2.0	3	2.9	25	2.2
	計	18	3.3	11	2.1	17	3.1	14	2.8	3	1.5	63	2.7
その他の消化器官用薬	男性	4	1.5	3	1.1	2	0.7	10	3.8	4	4.0	23	2.0
	女性	5	1.8	1	0.4	3	1.1	6	2.4	4	3.8	19	1.6
	計	9	1.7	4	0.8	5	0.9	16	3.1	8	3.9	42	1.8
脳下垂体ホルモン剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
唾液腺ホルモン剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	3	0.3
	女性	4	1.4	6	2.3	7	2.6	4	1.6	4	3.8	25	2.2
	計	4	0.7	7	1.3	7	1.3	6	1.2	4	2.0	28	1.2
タンパク同化ステロイド剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
副腎ホルモン剤	男性	4	1.5	1	0.4	5	1.8	6	2.3	2	2.0	18	1.5
	女性	9	3.3	4	1.5	7	2.6	14	5.7	2	1.9	36	3.1
	計	13	2.4	5	1.0	12	2.2	20	3.9	4	2.0	54	2.3
男性ホルモン剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	女性	7	2.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	0.7
	計	7	1.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	9	0.4
混合ホルモン剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	計	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
その他のホルモン剤	男性	3	1.1	1	0.4	2	0.7	0	0.0	1	1.0	7	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.0	2	0.2
	計	3	0.6	1	0.2	2	0.4	1	0.2	2	1.0	9	0.4

	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歯科用鎮痛鎮静剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歯髄乾屍剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歯髄覆たく剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歯科用抗生物質製剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の歯科口腔用薬	男性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
その他の個々の器官系用医薬品	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
ビタミンA剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
ビタミンD剤	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.5	3	3.0	8	0.7
	女性	0	0.0	1	0.4	10	3.8	18	7.3	12	11.4	41	3.6
	計	0	0.0	1	0.2	11	2.0	22	4.3	15	7.4	49	2.1
ビタミンB1剤	男性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.4	1	1.0	4	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.8	2	1.9	5	0.4
	計	0	0.0	0	0.0	3	0.5	3	0.6	3	1.5	9	0.4
ビタミンB剤 (B1除く)	男性	6	2.2	6	2.3	8	2.8	15	5.7	10	10.1	45	3.8
	女性	6	2.2	8	3.1	9	3.4	26	10.6	12	11.4	61	5.3
	計	12	2.2	14	2.7	17	3.1	41	8.1	22	10.8	106	4.5
ビタミンC剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.2
	計	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.1
ビタミンE剤	男性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	5	1.9	0	0.0	7	0.6
	女性	0	0.0	4	1.5	2	0.8	2	0.8	2	1.9	10	0.9
	計	0	0.0	5	1.0	3	0.5	7	1.4	2	1.0	17	0.7
ビタミンK剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	0.8	3	2.9	7	0.6
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.4	3	1.5	7	0.3
混合ビタミン剤	男性	1	0.4	0	0.0	1	0.4	2	0.8	4	4.0	8	0.7
	女性	1	0.4	6	2.3	6	2.3	5	2.0	8	7.6	26	2.3
	計	2	0.4	6	1.1	7	1.3	7	1.4	12	5.9	34	1.5
その他のビタミン剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.0	2	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5	2	0.1
カルシウム剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	3	1.1	4	1.6	3	2.9	10	0.9
	計	0	0.0	0	0.0	3	0.5	5	1.0	3	1.5	11	0.5
無機質製剤	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	3	3.0	5	0.4

	女性	8	2.9	5	1.9	0	0.0	0	0.0	2	1.9	15	1.3
	計	8	1.5	6	1.1	0	0.0	1	0.2	5	2.5	20	0.9
糖類剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
有機酸製剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
タンパクアミノ酸製剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.1
臓器製剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
乳幼児用剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の滋養強壮薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
血液代用剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.0
止血剤	男性	5	1.9	2	0.8	1	0.4	0	0.0	1	1.0	9	0.8
	女性	5	1.8	6	2.3	3	1.1	1	0.4	2	1.9	17	1.5
	計	10	1.8	8	1.5	4	0.7	1	0.2	3	1.5	26	1.1
血液凝固阻止剤	男性	0	0.0	1	0.4	3	1.1	10	3.8	8	8.1	22	1.9
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.8	2	1.9	5	0.4
	計	0	0.0	1	0.2	4	0.7	12	2.4	10	4.9	27	1.2
その他の血液・体液用薬	男性	1	0.4	5	1.9	7	2.5	26	9.9	13	13.1	52	4.4
	女性	1	0.4	3	1.2	6	2.3	17	6.9	16	15.2	43	3.7
	計	2	0.4	8	1.5	13	2.4	43	8.5	29	14.2	95	4.1
人工腎臓透析用剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
腹膜透析用剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の人工透析用薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
肝臓疾患用剤	男性	0	0.0	1	0.4	3	1.1	4	1.5	0	0.0	8	0.7
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	計	0	0.0	1	0.2	3	0.5	4	0.8	1	0.5	9	0.4
解毒剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	1	1.0	4	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.0	2	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.6	2	1.0	6	0.3
習慣性中毒用剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
痛風治療剤	男性	10	3.7	13	4.9	23	8.1	22	8.4	14	14.1	82	7.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	1.9	4	0.3

	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
代謝拮抗剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	1	0.4	2	0.8	1	0.4	0	0.0	0	0.0	4	0.3
	計	1	0.2	2	0.4	1	0.2	1	0.2	0	0.0	5	0.2
抗腫瘍性抗生物質製剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
抗腫瘍性植物成分製剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の腫瘍用薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	3	3.0	5	0.4
	女性	2	0.7	0	0.0	2	0.8	3	1.2	0	0.0	7	0.6
	計	2	0.4	0	0.0	2	0.4	5	1.0	3	1.5	12	0.5
抗ヒスタミン剤	男性	14	5.2	13	4.9	5	1.8	3	1.1	4	4.0	39	3.3
	女性	17	6.2	12	4.6	10	3.8	2	0.8	2	1.9	43	3.7
	計	31	5.7	25	4.8	15	2.7	5	1.0	6	2.9	82	3.5
刺激療法剤	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	3	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	1.0	3	0.3
	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	3	0.6	1	0.5	6	0.3
非特異性免疫原製剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他のアレルギー用薬	男性	22	8.2	21	7.9	15	5.3	19	7.3	11	11.1	88	7.5
	女性	24	8.7	24	9.2	14	5.3	23	9.3	11	10.5	96	8.3
	計	46	8.5	45	8.6	29	5.3	42	8.3	22	10.8	184	7.9
生薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
漢方製剤	男性	40	14.9	22	8.3	20	7.0	35	13.4	7	7.1	124	10.5
	女性	33	12.0	25	9.6	30	11.3	41	16.7	21	20.0	150	13.0
	計	73	13.4	47	9.0	50	9.1	76	15.0	28	13.7	274	11.8
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
主としてグラム陽性菌に作用する抗生物質	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
主としてグラム陰性菌に作用する抗生物質	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
主としてグラム陽性・陰性菌に作用する抗生物質	男性	9	3.4	6	2.3	4	1.4	7	2.7	0	0.0	26	2.2
	女性	6	2.2	2	0.8	9	3.4	6	2.4	1	1.0	24	2.1
	計	15	2.8	8	1.5	13	2.4	13	2.6	1	0.5	50	2.1
主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用する抗生物質	男性	6	2.2	1	0.4	1	0.4	4	1.5	4	4.0	16	1.4
	女性	2	0.7	6	2.3	4	1.5	6	2.4	3	2.9	21	1.8
	計	8	1.5	7	1.3	5	0.9	10	2.0	7	3.4	37	1.6
主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、作用する抗生物質	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
主として抗酸菌に作用する抗生物質	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.1

	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
生化学的検査用試薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
免疫血清学的検査用試薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
細菌学的検査用薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
病理組織検査用薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
体外診断用放射性医薬品	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の体外診断用医薬品	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
絆創膏	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
アヘンアルカロイド系製剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
コカアルカロイド系製剤	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他のアルカロイド系麻薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合成麻薬	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
分類不能の薬品	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
使用薬物なし	男性	104	38.8	93	35.1	76	26.8	44	16.8	13	13.1	330	28.0
	女性	112	40.6	86	33.1	54	20.4	25	10.2	4	3.8	281	24.4
	計	216	39.7	179	34.1	130	23.7	69	13.6	17	8.3	611	26.2
合計	男性	268	100.0	265	100.0	284	100.0	262	100.0	99	100.0	1178	100.0
	女性	276	100.0	260	100.0	265	100.0	246	100.0	105	100.0	1152	100.0
	計	544	100.0	525	100.0	549	100.0	508	100.0	204	100.0	2330	100.0