

I. 背景因子調査

1. 病歴

1) [既往歴・現病歴](#)

2) [薬剤治療](#)

3) [入院歴](#)

2. [婦人科系（女性のみ）](#)

3. 日常生活と健康

1) [健康](#)

2) [喫煙](#)

3) [運動・スポーツ活動](#)

4) [外出](#)

5) [健康関連QOL尺度（SF-36、身体機能）](#)

6) [要介護認定](#)

7) [膝および腰の既往歴と痛み](#)

4. [視覚](#)

5. [聴覚](#)

6. [転倒](#)

7. 排尿

1) [排尿症状](#)

2) [尿失禁](#)

1. 病歴

1) 既往歴・現病歴

脳血管障害・脳卒中（脳梗塞、脳血栓、脳出血）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	132	97.8	245	98.0	287	97.6	229	92.7	105	85.4	998	95.1
	女性	149	100.0	273	99.6	258	97.7	222	93.7	117	91.4	1019	96.9
	計	281	98.9	518	98.9	545	97.7	451	93.2	222	88.4	2017	96.0
治療中	男性	3	2.2	0	0.0	5	1.7	11	4.5	14	11.4	33	3.1
	女性	0	0.0	1	0.4	3	1.1	8	3.4	7	5.5	19	1.8
	計	3	1.1	1	0.2	8	1.4	19	3.9	21	8.4	52	2.5
以前治療した	男性	0	0.0	2	0.8	1	0.3	7	2.8	2	1.6	12	1.1
	女性	0	0.0	0	0.0	2	0.8	6	2.5	4	3.1	12	1.1
	計	0	0.0	2	0.4	3	0.5	13	2.7	6	2.4	24	1.1
治療せず	男性	0	0.0	3	1.2	1	0.3	0	0.0	2	1.6	6	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	0.2
	計	0	0.0	3	0.6	2	0.4	1	0.2	2	0.8	8	0.4

高血圧

40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上	計
---------	---------	---------	---------	-------	---

		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	116	85.9	198	79.2	181	61.6	139	56.3	55	44.7	689	65.7
	女性	145	97.3	238	86.9	181	68.6	136	57.4	47	36.7	747	71.0
	計	261	91.9	436	83.2	362	64.9	275	56.8	102	40.6	1436	68.3
治療中	男性	10	7.4	43	17.2	96	32.7	99	40.1	62	50.4	310	29.6
	女性	3	2.0	33	12.0	66	25.0	91	38.4	79	61.7	272	25.9
	計	13	4.6	76	14.5	162	29.0	190	39.3	141	56.2	582	27.7
以前治療した	男性	4	3.0	5	2.0	10	3.4	8	3.2	6	4.9	33	3.1
	女性	1	0.7	2	0.7	13	4.9	7	3.0	2	1.6	25	2.4
	計	5	1.8	7	1.3	23	4.1	15	3.1	8	3.2	58	2.8
治療せず	男性	5	3.7	4	1.6	7	2.4	1	0.4	0	0.0	17	1.6
	女性	0	0.0	1	0.4	4	1.5	3	1.3	0	0.0	8	0.8
	計	5	1.8	5	1.0	11	2.0	4	0.8	0	0.0	25	1.2

狭心症・心筋梗塞

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	134	99.3	245	98.0	274	93.2	221	89.5	104	84.6	978	93.2
	女性	149	100.0	273	99.6	255	96.6	223	94.1	112	87.5	1012	96.2
	計	283	99.6	518	98.9	529	94.8	444	91.7	216	86.1	1990	94.7
治療中	男性	0	0.0	5	2.0	18	6.1	21	8.5	15	12.2	59	5.6
	女性	0	0.0	0	0.0	5	1.9	12	5.1	13	10.2	30	2.9
	計	0	0.0	5	1.0	23	4.1	33	6.8	28	11.2	89	4.2
以前治療した	男性	1	0.7	0	0.0	2	0.7	4	1.6	3	2.4	10	1.0
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.8	2	0.8	3	2.3	8	0.8
	計	1	0.4	1	0.2	4	0.7	6	1.2	6	2.4	18	0.9
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.8	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.4	4	0.2

その他の心臓病（不整脈、弁膜症、心不全など）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.0
なし	男性	127	94.1	229	91.6	261	88.8	201	81.4	100	81.3	918	87.5
	女性	142	95.3	266	97.1	251	95.1	214	90.3	113	88.3	986	93.7
	計	269	94.7	495	94.5	512	91.8	415	85.7	213	84.9	1904	90.6
治療中	男性	2	1.5	7	2.8	13	4.4	24	9.7	16	13.0	62	5.9
	女性	0	0.0	1	0.4	6	2.3	11	4.6	5	3.9	23	2.2
	計	2	0.7	8	1.5	19	3.4	35	7.2	21	8.4	85	4.0
以前治療した	男性	2	1.5	5	2.0	6	2.0	5	2.0	5	4.1	23	2.2
	女性	4	2.7	3	1.1	2	0.8	5	2.1	7	5.5	21	2.0
	計	6	2.1	8	1.5	8	1.4	10	2.1	12	4.8	44	2.1
治療せず	男性	4	3.0	9	3.6	13	4.4	17	6.9	2	1.6	45	4.3
	女性	3	2.0	4	1.5	5	1.9	7	3.0	3	2.3	22	2.1
	計	7	2.5	13	2.5	18	3.2	24	5.0	5	2.0	67	3.2

脂質異常症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.0
なし	男性	115	85.2	202	80.8	231	78.6	197	79.8	102	82.9	847	80.7
	女性	144	96.6	233	85.0	177	67.0	151	63.7	96	75.0	801	76.1
	計	259	91.2	435	83.0	408	73.1	348	71.9	198	78.9	1648	78.4
治療中	男性	14	10.4	30	12.0	44	15.0	44	17.8	16	13.0	148	14.1
	女性	3	2.0	30	10.9	73	27.7	77	32.5	28	21.9	211	20.1
	計	17	6.0	60	11.5	117	21.0	121	25.0	44	17.5	359	17.1
以前治療した	男性	2	1.5	3	1.2	7	2.4	2	0.8	3	2.4	17	1.6
	女性	0	0.0	1	0.4	5	1.9	3	1.3	3	2.3	12	1.1
	計	2	0.7	4	0.8	12	2.2	5	1.0	6	2.4	29	1.4
治療せず	男性	4	3.0	15	6.0	12	4.1	4	1.6	1	0.8	36	3.4
	女性	2	1.3	10	3.6	9	3.4	6	2.5	1	0.8	28	2.7
	計	6	2.1	25	4.8	21	3.8	10	2.1	2	0.8	64	3.0

腎臓病

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	131	97.0	245	98.0	284	96.6	228	92.3	120	97.6	1008	96.1
	女性	148	99.3	266	97.1	249	94.3	230	97.0	125	97.7	1018	96.8
	計	279	98.2	511	97.5	533	95.5	458	94.6	245	97.6	2026	96.4
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	4	1.4	3	1.2	1	0.8	8	0.8
	女性	1	0.7	4	1.5	4	1.5	1	0.4	0	0.0	10	1.0
	計	1	0.4	4	0.8	8	1.4	4	0.8	1	0.4	18	0.9
以前治療した	男性	4	3.0	5	2.0	6	2.0	12	4.9	1	0.8	28	2.7
	女性	0	0.0	4	1.5	10	3.8	6	2.5	2	1.6	22	2.1
	計	4	1.4	9	1.7	16	2.9	18	3.7	3	1.2	50	2.4
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6	1	0.8	5	0.5
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.8	2	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.8	2	0.8	7	0.3

肝臓病

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
なし	男性	130	96.3	243	97.2	284	96.6	234	94.7	118	95.9	1009	96.2
	女性	148	99.3	261	95.3	256	97.0	231	97.5	120	93.8	1016	96.6
	計	278	97.9	504	96.2	540	96.8	465	96.1	238	94.8	2025	96.4
治療中	男性	1	0.7	0	0.0	5	1.7	6	2.4	1	0.8	13	1.2
	女性	0	0.0	2	0.7	2	0.8	2	0.8	2	1.6	8	0.8
	計	1	0.4	2	0.4	7	1.3	8	1.7	3	1.2	21	1.0
以前治療した	男性	4	3.0	5	2.0	5	1.7	6	2.4	4	3.3	24	2.3
	女性	0	0.0	7	2.6	4	1.5	3	1.3	5	3.9	19	1.8
	計	4	1.4	12	2.3	9	1.6	9	1.9	9	3.6	43	2.0
治療せず	男性	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	0.3
	女性	1	0.7	3	1.1	2	0.8	1	0.4	1	0.8	8	0.8

計	1	0.4	5	1.0	2	0.4	2	0.4	1	0.4	11	0.5
---	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	----	-----

胆石・胆嚢炎

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	128	94.8	238	95.2	272	92.5	218	88.3	104	84.6	960	91.5
	女性	146	98.0	260	94.9	242	91.7	215	90.7	113	88.3	976	92.8
	計	274	96.5	498	95.0	514	92.1	433	89.5	217	86.5	1936	92.1
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	3	2.4	5	0.5
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.2
	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.4	3	1.2	7	0.3
以前治療した	男性	6	4.4	9	3.6	16	5.4	22	8.9	13	10.6	66	6.3
	女性	1	0.7	8	2.9	20	7.6	18	7.6	12	9.4	59	5.6
	計	7	2.5	17	3.2	36	6.5	40	8.3	25	10.0	125	5.9
治療せず	男性	1	0.7	3	1.2	5	1.7	6	2.4	3	2.4	18	1.7
	女性	2	1.3	5	1.8	2	0.8	3	1.3	3	2.3	15	1.4
	計	3	1.1	8	1.5	7	1.3	9	1.9	6	2.4	33	1.6

糖尿病

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	132	97.8	237	94.8	253	86.1	202	81.8	109	88.6	933	88.9
	女性	146	98.0	260	94.9	246	93.2	213	89.9	116	90.6	981	93.3
	計	278	97.9	497	94.8	499	89.4	415	85.7	225	89.6	1914	91.1
治療中	男性	2	1.5	9	3.6	32	10.9	35	14.2	12	9.8	90	8.6
	女性	3	2.0	12	4.4	17	6.4	23	9.7	10	7.8	65	6.2
	計	5	1.8	21	4.0	49	8.8	58	12.0	22	8.8	155	7.4
以前治療した	男性	1	0.7	2	0.8	4	1.4	6	2.4	2	1.6	15	1.4
	女性	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.4	1	0.8	4	0.4
	計	1	0.4	4	0.8	4	0.7	7	1.4	3	1.2	19	0.9
治療せず	男性	0	0.0	2	0.8	5	1.7	4	1.6	0	0.0	11	1.0
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.8	2	0.2
	計	0	0.0	2	0.4	6	1.1	4	0.8	1	0.4	13	0.6

胃・十二指腸潰瘍

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	129	95.6	209	83.6	234	79.6	200	81.0	98	79.7	870	82.9
	女性	144	96.6	249	90.9	241	91.3	220	92.8	113	88.3	967	91.9
	計	273	96.1	458	87.4	475	85.1	420	86.8	211	84.1	1837	87.4
治療中	男性	1	0.7	2	0.8	4	1.4	4	1.6	2	1.6	13	1.2
	女性	1	0.7	1	0.4	3	1.1	3	1.3	6	4.7	14	1.3
	計	2	0.7	3	0.6	7	1.3	7	1.4	8	3.2	27	1.3
以前治療した	男性	4	3.0	34	13.6	50	17.0	42	17.0	22	17.9	152	14.5
	女性	2	1.3	22	8.0	20	7.6	13	5.5	9	7.0	66	6.3
	計	6	2.1	56	10.7	70	12.5	55	11.4	31	12.4	218	10.4
治療せず	男性	1	0.7	5	2.0	6	2.0	1	0.4	1	0.8	14	1.3
	女性	2	1.3	2	0.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0	5	0.5
	計	3	1.1	7	1.3	6	1.1	2	0.4	1	0.4	19	0.9

結核・肋膜炎

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	135	100.0	247	98.8	291	99.0	232	93.9	108	87.8	1013	96.6
	女性	148	99.3	269	98.2	258	97.7	235	99.2	110	85.9	1020	97.0
	計	283	99.6	516	98.5	549	98.4	467	96.5	218	86.9	2033	96.8
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
以前治療した	男性	0	0.0	3	1.2	3	1.0	14	5.7	15	12.2	35	3.3
	女性	1	0.7	5	1.8	6	2.3	2	0.8	18	14.1	32	3.0
	計	1	0.4	8	1.5	9	1.6	16	3.3	33	13.1	67	3.2
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0

喘息

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	127	94.1	237	94.8	283	96.3	239	96.8	116	94.3	1002	95.5
	女性	145	97.3	258	94.2	250	94.7	225	94.9	119	93.0	997	94.8
	計	272	95.8	495	94.5	533	95.5	464	95.9	235	93.6	1999	95.1
治療中	男性	1	0.7	0	0.0	6	2.0	5	2.0	4	3.3	16	1.5
	女性	2	1.3	2	0.7	1	0.4	5	2.1	4	3.1	14	1.3
	計	3	1.1	2	0.4	7	1.3	10	2.1	8	3.2	30	1.4
以前治療した	男性	7	5.2	13	5.2	5	1.7	3	1.2	3	2.4	31	3.0
	女性	2	1.3	14	5.1	13	4.9	7	3.0	5	3.9	41	3.9
	計	9	3.2	27	5.2	18	3.2	10	2.1	8	3.2	72	3.4
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

慢性気管支炎

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	134	99.3	248	99.2	290	98.6	240	97.2	120	97.6	1032	98.4
	女性	147	98.7	270	98.5	261	98.9	233	98.3	124	96.9	1035	98.4
	計	281	98.9	518	98.9	551	98.7	473	97.7	244	97.2	2067	98.4
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.8	1	0.8	4	0.4
	女性	1	0.7	0	0.0	1	0.4	2	0.8	3	2.3	7	0.7
	計	1	0.4	0	0.0	2	0.4	4	0.8	4	1.6	11	0.5
以前治療した	男性	1	0.7	2	0.8	2	0.7	3	1.2	1	0.8	9	0.9
	女性	1	0.7	4	1.5	2	0.8	1	0.4	1	0.8	9	0.9
	計	2	0.7	6	1.1	4	0.7	4	0.8	2	0.8	18	0.9
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.8	1	0.8	4	0.4
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.6	1	0.4	5	0.2

貧血

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	134	99.3	247	98.8	289	98.3	237	96.0	117	95.1	1024	97.6
	女性	104	69.8	183	66.8	207	78.4	212	89.5	104	81.3	810	77.0
	計	238	83.8	430	82.1	496	88.9	449	92.8	221	88.0	1834	87.3
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.1
	女性	2	1.3	4	1.5	1	0.4	3	1.3	2	1.6	12	1.1
	計	2	0.7	4	0.8	1	0.2	3	0.6	3	1.2	13	0.6
以前治療した	男性	0	0.0	2	0.8	4	1.4	5	2.0	2	1.6	13	1.2
	女性	36	24.2	82	29.9	51	19.3	17	7.2	16	12.5	202	19.2
	計	36	12.7	84	16.0	55	9.9	22	4.5	18	7.2	215	10.2
治療せず	男性	1	0.7	1	0.4	1	0.3	5	2.0	3	2.4	11	1.0
	女性	7	4.7	5	1.8	5	1.9	5	2.1	6	4.7	28	2.7
	計	8	2.8	6	1.1	6	1.1	10	2.1	9	3.6	39	1.9

骨粗鬆症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	134	99.3	249	99.6	289	98.3	236	95.5	116	94.3	1024	97.6
	女性	146	98.0	264	96.4	232	87.9	164	69.2	83	64.8	889	84.5
	計	280	98.6	513	97.9	521	93.4	400	82.6	199	79.3	1913	91.1
治療中	男性	1	0.7	1	0.4	2	0.7	7	2.8	3	2.4	14	1.3
	女性	1	0.7	6	2.2	25	9.5	55	23.2	34	26.6	121	11.5
	計	2	0.7	7	1.3	27	4.8	62	12.8	37	14.7	135	6.4
以前治療した	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	3	2.4	6	0.6
	女性	1	0.7	0	0.0	3	1.1	7	3.0	7	5.5	18	1.7
	計	1	0.4	0	0.0	3	0.5	10	2.1	10	4.0	24	1.1
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	3	1.0	1	0.4	1	0.8	5	0.5
	女性	1	0.7	4	1.5	4	1.5	11	4.6	4	3.1	24	2.3
	計	1	0.4	4	0.8	7	1.3	12	2.5	5	2.0	29	1.4

関節リウマチ

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	134	99.3	250	100.0	291	99.0	242	98.0	116	94.3	1033	98.5
	女性	149	100.0	270	98.5	254	96.2	230	97.0	120	93.8	1023	97.2
	計	283	99.6	520	99.2	545	97.7	472	97.5	236	94.0	2056	97.9
治療中	男性	1	0.7	0	0.0	2	0.7	2	0.8	4	3.3	9	0.9
	女性	0	0.0	4	1.5	7	2.7	4	1.7	2	1.6	17	1.6
	計	1	0.4	4	0.8	9	1.6	6	1.2	6	2.4	26	1.2
以前治療した	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.8	3	2.4	6	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	3	1.1	2	0.8	4	3.1	9	0.9
	計	0	0.0	0	0.0	4	0.7	4	0.8	7	2.8	15	0.7
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	1.6	3	0.3
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.8	4	0.2

変形性膝関節症

甲状腺疾患

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	134	99.3	246	98.4	292	99.3	240	97.2	117	95.1	1029	98.1
	女性	142	95.3	253	92.3	240	90.9	222	93.7	121	94.5	978	93.0
	計	276	97.2	499	95.2	532	95.3	462	95.5	238	94.8	2007	95.5
治療中	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.8	2	1.6	5	0.5
	女性	2	1.3	4	1.5	8	3.0	7	3.0	1	0.8	22	2.1
	計	2	0.7	5	1.0	8	1.4	9	1.9	3	1.2	27	1.3
以前治療した	男性	1	0.7	3	1.2	2	0.7	3	1.2	4	3.3	13	1.2
	女性	4	2.7	16	5.8	11	4.2	7	3.0	5	3.9	43	4.1
	計	5	1.8	19	3.6	13	2.3	10	2.1	9	3.6	56	2.7
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	2	0.2
	女性	1	0.7	1	0.4	5	1.9	1	0.4	1	0.8	9	0.9
	計	1	0.4	1	0.2	5	0.9	3	0.6	1	0.4	11	0.5

がん

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	135	100.0	247	98.8	275	93.5	212	85.8	104	84.6	973	92.8
	女性	144	96.6	255	93.1	247	93.6	221	93.2	109	85.2	976	92.8
	計	279	98.2	502	95.8	522	93.5	433	89.5	213	84.9	1949	92.8
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	1.6	4	3.3	9	0.9
	女性	2	1.3	4	1.5	2	0.8	0	0.0	2	1.6	10	1.0
	計	2	0.7	4	0.8	3	0.5	4	0.8	6	2.4	19	0.9
以前治療した	男性	0	0.0	3	1.2	18	6.1	31	12.6	13	10.6	65	6.2
	女性	3	2.0	15	5.5	15	5.7	16	6.8	17	13.3	66	6.3
	計	3	1.1	18	3.4	33	5.9	47	9.7	30	12.0	131	6.2
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	0.1

骨折

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.0
なし	男性	90	66.7	161	64.4	210	71.4	173	70.0	90	73.2	724	69.0
	女性	124	83.2	227	82.8	215	81.4	172	72.6	76	59.4	814	77.4
	計	214	75.4	388	74.0	425	76.2	345	71.3	166	66.1	1538	73.2
治療中	男性	0	0.0	2	0.8	1	0.3	0	0.0	1	0.8	4	0.4
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.8	0	0.0	6	4.7	9	0.9
	計	0	0.0	3	0.6	3	0.5	0	0.0	7	2.8	13	0.6
以前治療した	男性	44	32.6	86	34.4	81	27.6	73	29.6	31	25.2	315	30.0
	女性	25	16.8	46	16.8	46	17.4	64	27.0	46	35.9	227	21.6
	計	69	24.3	132	25.2	127	22.8	137	28.3	77	30.7	542	25.8
治療せず	男性	1	0.7	1	0.4	2	0.7	1	0.4	1	0.8	6	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.4	1	0.2	2	0.4	2	0.4	1	0.4	7	0.3

前立腺肥大

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
なし	男性	135	100.0	245	98.0	273	92.9	193	78.1	82	66.7	928	88.5
	女性	149	100.0	274	100.0	264	100.0	237	100.0	128	100.0	1052	100.0
	計	284	100.0	519	99.0	537	96.2	430	88.8	210	83.7	1980	94.2
治療中	男性	0	0.0	1	0.4	10	3.4	14	5.7	17	13.8	42	4.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	1	0.2	10	1.8	14	2.9	17	6.8	42	2.0
以前治療した	男性	0	0.0	3	1.2	7	2.4	28	11.3	16	13.0	54	5.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	3	0.6	7	1.3	28	5.8	16	6.4	54	2.6
治療せず	男性	0	0.0	1	0.4	4	1.4	11	4.5	8	6.5	24	2.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	1	0.2	4	0.7	11	2.3	8	3.2	24	1.1

認知症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.0
なし	男性	135	100.0	250	100.0	294	100.0	243	98.4	118	95.9	1040	99.1
	女性	149	100.0	274	100.0	264	100.0	237	100.0	123	96.1	1047	99.5
	計	284	100.0	524	100.0	558	100.0	480	99.2	241	96.0	2087	99.3
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6	5	4.1	9	0.9
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.1	4	0.4
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.8	9	3.6	13	0.6
以前治療した	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

パーキンソン病

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.0
なし	男性	135	100.0	250	100.0	292	99.3	246	99.6	123	100.0	1046	99.7
	女性	149	100.0	273	99.6	264	100.0	237	100.0	127	99.2	1050	99.8
	計	284	100.0	523	99.8	556	99.6	483	99.8	250	99.6	2096	99.8
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	2	0.2
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1

	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	3	0.1
以前治療した	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.0
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

2) 薬剤治療

処方薬の定期的な服用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
服用している	男性	38	28.1	94	37.6	166	56.5	177	71.7	105	85.4	580	55.3
	女性	28	18.8	82	29.9	152	57.6	182	76.8	107	83.6	551	52.4
	計	66	23.2	176	33.6	318	57.0	359	74.2	212	84.5	1131	53.8
服用していない	男性	97	71.9	156	62.4	128	43.5	70	28.3	18	14.6	469	44.7
	女性	121	81.2	192	70.1	112	42.4	55	23.2	21	16.4	501	47.6
	計	218	76.8	348	66.4	240	43.0	125	25.8	39	15.5	970	46.2

種別処方薬（定期的な服用者のみ：複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
高血圧	男性	10	26.3	43	45.7	98	59.0	99	55.9	63	60.0	313	54.0
	女性	3	10.7	34	41.5	68	44.7	91	50.0	79	73.8	275	49.9
	計	13	19.7	77	43.8	166	52.2	190	52.9	142	67.0	588	52.0
狭心症・心筋梗塞	男性	0	0.0	5	5.3	17	10.2	21	11.9	15	14.3	58	10.0
	女性	0	0.0	0	0.0	5	3.3	12	6.6	13	12.1	30	5.4
	計	0	0.0	5	2.8	22	6.9	33	9.2	28	13.2	88	7.8
不整脈	男性	1	2.6	5	5.3	12	7.2	19	10.7	14	13.3	51	8.8
	女性	0	0.0	1	1.2	5	3.3	8	4.4	4	3.7	18	3.3
	計	1	1.5	6	3.4	17	5.3	27	7.5	18	8.5	69	6.1
心不全	男性	0	0.0	1	1.1	1	0.6	3	1.7	4	3.8	9	1.6
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.9	3	0.5
	計	0	0.0	1	0.6	1	0.3	4	1.1	6	2.8	12	1.1
糖尿病	男性	0	0.0	9	9.6	32	19.3	32	18.1	11	10.5	84	14.5
	女性	3	10.7	12	14.6	15	9.9	22	12.1	9	8.4	61	11.1
	計	3	4.5	21	11.9	47	14.8	54	15.0	20	9.4	145	12.8
脳血管障害	男性	3	7.9	0	0.0	5	3.0	11	6.2	11	10.5	30	5.2
	女性	0	0.0	1	1.2	3	2.0	8	4.4	7	6.5	19	3.4
	計	3	4.5	1	0.6	8	2.5	19	5.3	18	8.5	49	4.3
不眠・不安	男性	2	5.3	5	5.3	7	4.2	15	8.5	10	9.5	39	6.7
	女性	3	10.7	4	4.9	10	6.6	23	12.6	32	29.9	72	13.1
	計	5	7.6	9	5.1	17	5.3	38	10.6	42	19.8	111	9.8
うつ	男性	4	10.5	5	5.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	10	1.7
	女性	0	0.0	2	2.4	1	0.7	1	0.5	1	0.9	5	0.9
	計	4	6.1	7	4.0	1	0.3	2	0.6	1	0.5	15	1.3
認知症	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7	4	3.8	7	1.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.8	3	0.5
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	7	3.3	10	0.9
脂質異常症	男性	14	36.8	30	31.9	42	25.3	44	24.9	16	15.2	146	25.2
	女性	3	10.7	30	36.6	73	48.0	77	42.3	28	26.2	211	38.3

	計	17	25.8	60	34.1	115	36.2	121	33.7	44	20.8	357	31.6
胃腸障害	男性	4	10.5	7	7.4	16	9.6	21	11.9	21	20.0	69	11.9
	女性	3	10.7	6	7.3	14	9.2	17	9.3	26	24.3	66	12.0
	計	7	10.6	13	7.4	30	9.4	38	10.6	47	22.2	135	11.9
ホルモン剤	男性	1	2.6	1	1.1	0	0.0	2	1.1	6	5.7	10	1.7
	女性	4	14.3	7	8.5	10	6.6	8	4.4	1	0.9	30	5.4
	計	5	7.6	8	4.5	10	3.1	10	2.8	7	3.3	40	3.5
骨粗鬆症	男性	1	2.6	1	1.1	2	1.2	7	4.0	2	1.9	13	2.2
	女性	1	3.6	7	8.5	24	15.8	54	29.7	34	31.8	120	21.8
	計	2	3.0	8	4.5	26	8.2	61	17.0	36	17.0	133	11.8
その他	男性	16	42.1	32	34.0	58	34.9	72	40.7	53	50.5	231	39.8
	女性	16	57.1	29	35.4	31	20.4	47	25.8	29	27.1	152	27.6
	計	32	48.5	61	34.7	89	28.0	119	33.1	82	38.7	383	33.9
計	男性	38	100.0	94	100.0	166	100.0	177	100.0	105	100.0	580	100.0
	女性	28	100.0	82	100.0	152	100.0	182	100.0	107	100.0	551	100.0
	計	66	100.0	176	100.0	318	100.0	359	100.0	212	100.0	1131	100.0

3) 入院歴

過去2年間の入院

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	12	8.9	19	7.6	26	8.8	41	16.6	38	30.9	136	13.0
	女性	12	8.1	20	7.3	19	7.2	39	16.5	24	18.8	114	10.8
	計	24	8.5	39	7.4	45	8.1	80	16.5	62	24.7	250	11.9
なし	男性	123	91.1	231	92.4	268	91.2	206	83.4	85	69.1	913	87.0
	女性	137	91.9	254	92.7	245	92.8	198	83.5	104	81.3	938	89.2
	計	260	91.5	485	92.6	513	91.9	404	83.5	189	75.3	1851	88.1

2. 婦人科系（女性のみ）

初潮年齢

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
年齢	12.5	1.3	149	12.5	1.4	274	13.3	1.4	263	13.9	1.4	236	14.7	1.8	122	13.3	1.6	1044

月経の有無

	40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	122	81.9	63	23.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	185	17.6
なし	16	10.7	191	69.7	264	100.0	237	100.0	128	100.0	836	79.5
わからない	11	7.4	20	7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	2.9
計	149	100.0	274	100.0	264	100.0	237	100.0	128	100.0	1052	100.0

閉経年齢（閉経女性のみ）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
年齢	44.8	2.8	16	49.5	4.0	190	50.6	4.2	263	48.9	5.2	228	49.9	5.3	117	49.6	4.7	814

子宮摘出術既往（閉経女性のみ）

	40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	2	0.2
あり	9	56.3	19	9.9	30	11.4	43	18.1	28	21.9	129	15.4
なし	7	43.8	172	90.1	234	88.6	192	81.0	98	76.6	703	84.1
わからない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	0.2
計	16	100.0	191	100.0	264	100.0	237	100.0	128	100.0	836	100.0

子宮摘出年齢（子宮摘出女性のみ）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
年齢	43.6	2.8	9	43.2	6.6	19	46.5	9.1	30	44.3	8.8	43	48.0	11.7	26	45.4	9.0	127

卵巣温存の有無（子宮摘出女性のみ）

	40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	8	88.9	14	73.7	21	70.0	21	48.8	12	42.9	76	58.9
なし	1	11.1	5	26.3	7	23.3	16	37.2	10	35.7	39	30.2
わからない	0	0.0	0	0.0	2	6.7	6	14.0	6	21.4	14	10.9
計	9	100.0	19	100.0	30	100.0	43	100.0	28	100.0	129	100.0

最近1年の月経周期変化（月経のある女性のみ）

	40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
変化あり	49	40.2	38	60.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	87	47.0
変化なし	67	54.9	22	34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	89	48.1
わからない	6	4.9	3	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	4.9
計	122	100.0	63	100.0	0	100.0	0	100.0	0	100.0	185	100.0

3. 日常生活と健康

1) 健康

自覚的健康度

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
非常に良い	男性	12	8.9	19	7.6	16	5.4	11	4.5	2	1.6	60	5.7
	女性	6	4.0	10	3.6	9	3.4	8	3.4	5	3.9	38	3.6
	計	18	6.3	29	5.5	25	4.5	19	3.9	7	2.8	98	4.7
良い	男性	53	39.3	96	38.4	104	35.4	78	31.6	27	22.0	358	34.1
	女性	71	47.7	106	38.7	83	31.4	60	25.3	21	16.4	341	32.4
	計	124	43.7	202	38.5	187	33.5	138	28.5	48	19.1	699	33.3
普通	男性	64	47.4	128	51.2	165	56.1	144	58.3	81	65.9	582	55.5
	女性	67	45.0	138	50.4	156	59.1	150	63.3	83	64.8	594	56.5
	計	131	46.1	266	50.8	321	57.5	294	60.7	164	65.3	1176	56.0
悪い	男性	6	4.4	6	2.4	9	3.1	13	5.3	13	10.6	47	4.5
	女性	4	2.7	19	6.9	16	6.1	18	7.6	19	14.8	76	7.2
	計	10	3.5	25	4.8	25	4.5	31	6.4	32	12.7	123	5.9

非常に悪い	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.2
	女性	1	0.7	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	0.3
	計	1	0.4	2	0.4	0	0.0	2	0.4	0	0.0	5	0.2

2) 喫煙

喫煙の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
以前から吸わない	男性	59	43.7	82	32.8	78	26.5	70	28.3	36	29.3	325	31.0
	女性	129	86.6	235	85.8	234	88.6	226	95.4	122	95.3	946	89.9
	計	188	66.2	317	60.5	312	55.9	296	61.2	158	62.9	1271	60.5
やめた	男性	51	37.8	108	43.2	156	53.1	156	63.2	83	67.5	554	52.8
	女性	14	9.4	31	11.3	19	7.2	8	3.4	5	3.9	77	7.3
	計	65	22.9	139	26.5	175	31.4	164	33.9	88	35.1	631	30.0
現在吸っている	男性	25	18.5	60	24.0	60	20.4	21	8.5	4	3.3	170	16.2
	女性	6	4.0	8	2.9	11	4.2	3	1.3	1	0.8	29	2.8
	計	31	10.9	68	13.0	71	12.7	24	5.0	5	2.0	199	9.5

禁煙者の喫煙開始年齢

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	19.5	1.2	51	19.5	1.6	107	20.4	2.5	156	22.3	8.2	155	20.8	4.0	82	20.7	5.0	551
女性	22.5	5.3	14	22.2	5.1	31	21.6	4.8	19	30.6	7.1	8	27.4	13.4	5	23.3	6.5	77
計	20.1	2.9	65	20.1	3.0	138	20.5	2.9	175	22.7	8.4	163	21.1	5.1	87	21.0	5.3	628

禁煙者の禁煙年齢

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	33.2	7.5	51	36.1	9.6	107	42.8	12.5	156	51.1	14.6	155	54.5	14.9	82	44.7	14.6	551
女性	32.2	6.4	14	35.6	10.6	31	44.7	15.3	19	63.8	9.2	8	59.6	26.9	5	41.7	16.1	77
計	33.0	7.2	65	36.0	9.8	138	43.0	12.8	175	51.7	14.6	163	54.8	15.6	87	44.3	14.8	628

禁煙者の過去の喫煙本数（本／日）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	18.2	8.3	51	18.2	7.2	108	20.5	9.4	156	21.0	10.1	154	18.8	9.9	81	19.7	9.2	550
女性	9.5	6.7	14	10.7	6.2	31	14.7	9.9	19	11.0	6.8	8	16.0	14.7	5	11.8	8.2	77
計	16.3	8.7	65	16.5	7.7	139	19.9	9.6	175	20.5	10.1	162	18.7	10.2	86	18.8	9.5	627

喫煙者の喫煙開始年齢

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	21.1	4.7	25	20.8	5.6	60	20.2	3.4	60	23.5	11.6	21	20.5	1.0	4	21.0	5.9	170
女性	20.0	0.0	6	19.8	0.7	8	28.0	6.8	11	42.7	20.0	3	45.0	.	1	26.2	10.4	29
計	20.9	4.3	31	20.7	5.3	68	21.4	4.9	71	25.9	13.9	24	25.4	11.0	5	21.7	7.0	199

喫煙者の現在の喫煙本数（本／日）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	14.8	5.3	25	18.8	8.8	60	18.7	7.1	60	18.2	10.4	21	13.3	5.4	4	18.0	8.0	170
女性	15.0	6.3	6	13.4	4.4	8	11.9	5.9	11	20.0	17.3	3	6.0	.	1	13.6	7.4	29
計	14.8	5.4	31	18.1	8.6	68	17.6	7.3	71	18.4	11.0	24	11.8	5.7	5	17.3	8.1	199

禁煙者の禁煙した理由（複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
以前ほど吸いたくなくなった	男性	11	21.6	24	22.2	25	16.0	15	9.6	8	9.6	83	15.0
	女性	4	28.6	8	25.8	3	15.8	2	25.0	0	0.0	17	22.1
	計	15	23.1	32	23.0	28	16.0	17	10.4	8	9.1	100	15.8
病気のため	男性	3	5.9	14	13.0	28	17.9	47	30.1	26	31.3	118	21.3
	女性	1	7.1	3	9.7	5	26.3	1	12.5	0	0.0	10	13.0
	計	4	6.2	17	12.2	33	18.9	48	29.3	26	29.5	128	20.3
健康に害があるような気がするから	男性	32	62.7	63	58.3	90	57.7	88	56.4	49	59.0	322	58.1
	女性	8	57.1	12	38.7	9	47.4	4	50.0	3	60.0	36	46.8
	計	40	61.5	75	54.0	99	56.6	92	56.1	52	59.1	358	56.7
家族が嫌がるから	男性	16	31.4	33	30.6	56	35.9	63	40.4	18	21.7	186	33.6
	女性	3	21.4	7	22.6	4	21.1	3	37.5	0	0.0	17	22.1
	計	19	29.2	40	28.8	60	34.3	66	40.2	18	20.5	203	32.2
経済上の理由から	男性	7	13.7	12	11.1	15	9.6	8	5.1	4	4.8	46	8.3
	女性	2	14.3	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	4	5.2
	計	9	13.8	12	8.6	15	8.6	10	6.1	4	4.5	50	7.9
その他	男性	8	15.7	10	9.3	12	7.7	13	8.3	4	4.8	47	8.5
	女性	2	14.3	5	16.1	5	26.3	0	0.0	1	20.0	13	16.9
	計	10	15.4	15	10.8	17	9.7	13	7.9	5	5.7	60	9.5
計	男性	51	100.0	108	100.0	156	100.0	156	100.0	83	100.0	554	100.0
	女性	14	100.0	31	100.0	19	100.0	8	100.0	5	100.0	77	100.0
	計	65	100.0	139	100.0	175	100.0	164	100.0	88	100.0	631	100.0

3) 運動・スポーツ活動

過去1年間の運動習慣（1回20分以上、1ヶ月に1回以上）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	61	45.2	132	52.8	168	57.1	174	70.4	71	57.7	606	57.8
	女性	61	40.9	118	43.1	147	55.7	164	69.2	62	48.4	552	52.5
	計	122	43.0	250	47.7	315	56.5	338	69.8	133	53.0	1158	55.1
なし	男性	74	54.8	118	47.2	126	42.9	73	29.6	52	42.3	443	42.2
	女性	88	59.1	156	56.9	117	44.3	73	30.8	66	51.6	500	47.5
	計	162	57.0	274	52.3	243	43.5	146	30.2	118	47.0	943	44.9

4) 外出

外出（仕事、買い物、散歩、通院なども含む）する頻度

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1

体に不自由があっ て歩行や外出がま まならない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	7	50.0	8	30.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	6	42.9	7	25.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	13	46.4	15	27.8
体力に自信がない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	42.9	6	23.1
	女性	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	25.0	7	50.0	10	35.7
	計	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	13.3	13	46.4	16	29.6
外出の必要がない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	57.1	8	57.1	12	46.2
	女性	0	0.0	2	66.7	2	66.7	6	75.0	7	50.0	17	60.7
	計	0	0.0	2	40.0	2	33.3	10	66.7	15	53.6	29	53.7
外出がおっくう	男性	0	0.0	0	0.0	1	33.3	4	57.1	5	35.7	10	38.5
	女性	0	0.0	1	33.3	2	66.7	1	12.5	1	7.1	5	17.9
	計	0	0.0	1	20.0	3	50.0	5	33.3	6	21.4	15	27.8
外出したい場所が ない	男性	0	0.0	1	50.0	1	33.3	4	57.1	3	21.4	9	34.6
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	14.3	3	10.7
	計	0	0.0	1	20.0	1	16.7	5	33.3	5	17.9	12	22.2
自由に使えるお金 がない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	3	10.7
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.7	3	5.6
誘ってくれる人が いない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	3.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	1.9
その他	男性	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	3.8
	女性	0	0.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	2	7.1
	計	0	0.0	1	20.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	3	5.6
特になし	男性	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	7.7
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	3.6
	計	0	0.0	1	20.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	3	5.6
計	男性	0	100.0	2	100.0	3	100.0	7	100.0	14	100.0	26	100.0
	女性	0	100.0	3	100.0	3	100.0	8	100.0	14	100.0	28	100.0
	計	0	100.0	5	100.0	6	100.0	15	100.0	28	100.0	54	100.0

友達・近所の人あるいは別居家族や親戚と会って会話する頻度

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
毎日1回もしくはそ れ以上	男性	128	94.8	243	97.2	210	71.4	124	50.2	46	37.4	751	71.6
	女性	117	78.5	200	73.0	156	59.1	112	47.3	50	39.1	635	60.4
	計	245	86.3	443	84.5	366	65.6	236	48.8	96	38.2	1386	66.0
2～3日に1回程度	男性	3	2.2	2	0.8	54	18.4	78	31.6	37	30.1	174	16.6
	女性	24	16.1	47	17.2	63	23.9	99	41.8	47	36.7	280	26.6
	計	27	9.5	49	9.4	117	21.0	177	36.6	84	33.5	454	21.6
1週間に1回程度	男性	2	1.5	3	1.2	20	6.8	30	12.1	28	22.8	83	7.9
	女性	6	4.0	21	7.7	34	12.9	22	9.3	23	18.0	106	10.1
	計	8	2.8	24	4.6	54	9.7	52	10.7	51	20.3	189	9.0
1か月に1回程度	男性	1	0.7	1	0.4	6	2.0	8	3.2	8	6.5	24	2.3
	女性	2	1.3	4	1.5	10	3.8	3	1.3	3	2.3	22	2.1
	計	3	1.1	5	1.0	16	2.9	11	2.3	11	4.4	46	2.2
ほとんどない	男性	1	0.7	1	0.4	4	1.4	7	2.8	4	3.3	17	1.6
	女性	0	0.0	2	0.7	1	0.4	1	0.4	5	3.9	9	0.9
	計	1	0.4	3	0.6	5	0.9	8	1.7	9	3.6	26	1.2

外出するにあたっての介助の要否

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.0
必要	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.4	7	5.7	13	1.2
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	15	11.7	17	1.6
	計	0	0.0	1	0.2	0	0.0	7	1.4	22	8.8	30	1.4
不要	男性	135	100.0	250	100.0	294	100.0	241	97.6	116	94.3	1036	98.8
	女性	149	100.0	273	99.6	263	99.6	236	99.6	113	88.3	1034	98.3
	計	284	100.0	523	99.8	557	99.8	477	98.6	229	91.2	2070	98.5

身体が不自由なため、外出して人に見られるのが恥ずかしいという気持ちがある

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
ある	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.2	5	4.1	9	0.9
	女性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	2	0.8	6	4.7	10	1.0
	計	0	0.0	1	0.2	2	0.4	5	1.0	11	4.4	19	0.9
ない	男性	135	100.0	250	100.0	293	99.7	243	98.4	118	95.9	1039	99.0
	女性	149	100.0	273	99.6	263	99.6	235	99.2	122	95.3	1042	99.0
	計	284	100.0	523	99.8	556	99.6	478	98.8	240	95.6	2081	99.0

主に生活する部屋の階数

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
1階	男性	83	61.5	134	53.6	210	71.4	198	80.2	104	84.6	729	69.5
	女性	92	61.7	195	71.2	229	86.7	203	85.7	110	85.9	829	78.8
	計	175	61.6	329	62.8	439	78.7	401	82.9	214	85.3	1558	74.2
2階	男性	23	17.0	89	35.6	64	21.8	35	14.2	17	13.8	228	21.7
	女性	39	26.2	56	20.4	20	7.6	21	8.9	11	8.6	147	14.0
	計	62	21.8	145	27.7	84	15.1	56	11.6	28	11.2	375	17.8
3階以上	男性	29	21.5	27	10.8	20	6.8	14	5.7	2	1.6	92	8.8
	女性	18	12.1	23	8.4	15	5.7	13	5.5	7	5.5	76	7.2
	計	47	16.5	50	9.5	35	6.3	27	5.6	9	3.6	168	8.0

家の周辺に、坂があったり、車の交通量が多かったりなどで、外出に不安を感じることがある

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ある	男性	5	3.7	15	6.0	14	4.8	27	10.9	31	25.2	92	8.8
	女性	7	4.7	23	8.4	18	6.8	52	21.9	43	33.6	143	13.6
	計	12	4.2	38	7.3	32	5.7	79	16.3	74	29.5	235	11.2
ない	男性	130	96.3	235	94.0	280	95.2	220	89.1	92	74.8	957	91.2
	女性	142	95.3	251	91.6	246	93.2	185	78.1	85	66.4	909	86.4
	計	272	95.8	486	92.7	526	94.3	405	83.7	177	70.5	1866	88.8

5) 健康関連QOL尺度 (SF-36、身体機能)、正座の困難度

SF-36 : 激しい活動、例えば一生懸命走る、重い物を持ち上げる、激しいスポーツをするなど

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	3	2.2	15	6.0	33	11.2	60	24.3	56	45.5	167	15.9
	女性	8	5.4	39	14.2	43	16.3	80	33.8	71	55.5	241	22.9
	計	11	3.9	54	10.3	76	13.6	140	28.9	127	50.6	408	19.4
少し難しい	男性	37	27.4	83	33.2	140	47.6	140	56.7	59	48.0	459	43.8
	女性	59	39.6	119	43.4	136	51.5	127	53.6	46	35.9	487	46.3
	計	96	33.8	202	38.5	276	49.5	267	55.2	105	41.8	946	45.0
ぜんぜん難しくない	男性	95	70.4	152	60.8	121	41.2	47	19.0	8	6.5	423	40.3
	女性	82	55.0	116	42.3	85	32.2	30	12.7	11	8.6	324	30.8
	計	177	62.3	268	51.1	206	36.9	77	15.9	19	7.6	747	35.6

SF-36 : 適度の活動、例えば家や庭の掃除をする、1～2時間散歩するなど

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	2.0	9	7.3	15	1.4
	女性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	3	1.3	16	12.5	21	2.0
	計	0	0.0	1	0.2	2	0.4	8	1.7	25	10.0	36	1.7
少し難しい	男性	4	3.0	7	2.8	9	3.1	34	13.8	35	28.5	89	8.5
	女性	7	4.7	18	6.6	21	8.0	45	19.0	47	36.7	138	13.1
	計	11	3.9	25	4.8	30	5.4	79	16.3	82	32.7	227	10.8
ぜんぜん難しくない	男性	131	97.0	243	97.2	284	96.6	208	84.2	79	64.2	945	90.1
	女性	142	95.3	255	93.1	242	91.7	189	79.7	65	50.8	893	84.9
	計	273	96.1	498	95.0	526	94.3	397	82.0	144	57.4	1838	87.5

SF-36 : 少し重い物を持ち上げたり、運んだりする (例えば買い物袋など)

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	7	2.8	11	8.9	19	1.8
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.8	20	15.6	23	2.2
	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	9	1.9	31	12.4	42	2.0
少し難しい	男性	2	1.5	8	3.2	14	4.8	27	10.9	31	25.2	82	7.8
	女性	7	4.7	33	12.0	35	13.3	68	28.7	56	43.8	199	18.9
	計	9	3.2	41	7.8	49	8.8	95	19.6	87	34.7	281	13.4
ぜんぜん難しくない	男性	133	98.5	242	96.8	279	94.9	213	86.2	81	65.9	948	90.4
	女性	142	95.3	240	87.6	229	86.7	167	70.5	52	40.6	830	78.9
	計	275	96.8	482	92.0	508	91.0	380	78.5	133	53.0	1778	84.6

SF-36 : 階段を数階上までのぼる

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	1	0.7	0	0.0	2	0.7	6	2.4	12	9.8	21	2.0
	女性	0	0.0	2	0.7	3	1.1	9	3.8	27	21.1	41	3.9
	計	1	0.4	2	0.4	5	0.9	15	3.1	39	15.5	62	3.0
少し難しい	男性	6	4.4	11	4.4	28	9.5	47	19.0	48	39.0	140	13.3
	女性	14	9.4	32	11.7	47	17.8	64	27.0	45	35.2	202	19.2
	計	20	7.0	43	8.2	75	13.4	111	22.9	93	37.1	342	16.3

ぜんぜん難しくない	男性	128	94.8	239	95.6	264	89.8	194	78.5	63	51.2	888	84.7
	女性	135	90.6	240	87.6	214	81.1	164	69.2	56	43.8	809	76.9
	計	263	92.6	479	91.4	478	85.7	358	74.0	119	47.4	1697	80.8

SF-36：階段を1階上までのぼる

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	4	3.3	7	0.7
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.8	3	1.3	14	10.9	20	1.9
	計	0	0.0	1	0.2	2	0.4	6	1.2	18	7.2	27	1.3
少し難しい	男性	2	1.5	2	0.8	2	0.7	14	5.7	31	25.2	51	4.9
	女性	3	2.0	4	1.5	10	3.8	26	11.0	31	24.2	74	7.0
	計	5	1.8	6	1.1	12	2.2	40	8.3	62	24.7	125	5.9
ぜんぜん難しくない	男性	133	98.5	248	99.2	292	99.3	230	93.1	88	71.5	991	94.5
	女性	146	98.0	269	98.2	252	95.5	208	87.8	83	64.8	958	91.1
	計	279	98.2	517	98.7	544	97.5	438	90.5	171	68.1	1949	92.8

SF-36：体を前に曲げる、ひざまずく、かがむ

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
とても難しい	男性	1	0.7	2	0.8	3	1.0	6	2.4	3	2.4	15	1.4
	女性	2	1.3	2	0.7	5	1.9	6	2.5	17	13.3	32	3.0
	計	3	1.1	4	0.8	8	1.4	12	2.5	20	8.0	47	2.2
少し難しい	男性	3	2.2	22	8.8	25	8.5	35	14.2	49	39.8	134	12.8
	女性	6	4.0	31	11.3	36	13.6	47	19.8	44	34.4	164	15.6
	計	9	3.2	53	10.1	61	10.9	82	16.9	93	37.1	298	14.2
ぜんぜん難しくない	男性	131	97.0	226	90.4	266	90.5	205	83.0	71	57.7	899	85.7
	女性	141	94.6	241	88.0	223	84.5	184	77.6	67	52.3	856	81.4
	計	272	95.8	467	89.1	489	87.6	389	80.4	138	55.0	1755	83.5

SF-36：1キロメートル以上歩く

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
とても難しい	男性	1	0.7	0	0.0	1	0.3	11	4.5	16	13.0	29	2.8
	女性	1	0.7	4	1.5	2	0.8	6	2.5	35	27.3	48	4.6
	計	2	0.7	4	0.8	3	0.5	17	3.5	51	20.3	77	3.7
少し難しい	男性	3	2.2	5	2.0	19	6.5	15	6.1	30	24.4	72	6.9
	女性	4	2.7	22	8.0	24	9.1	53	22.4	30	23.4	133	12.6
	計	7	2.5	27	5.2	43	7.7	68	14.0	60	23.9	205	9.8
ぜんぜん難しくない	男性	131	97.0	245	98.0	274	93.2	221	89.5	77	62.6	948	90.4
	女性	144	96.6	248	90.5	238	90.2	177	74.7	63	49.2	870	82.7
	計	275	96.8	493	94.1	512	91.8	398	82.2	140	55.8	1818	86.5

SF-36：数百メートル以上歩く

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	6	2.4	10	8.1	17	1.6
	女性	1	0.7	1	0.4	0	0.0	3	1.3	19	14.8	24	2.3
	計	1	0.4	1	0.2	1	0.2	9	1.9	29	11.6	41	2.0
少し難しい	男性	2	1.5	0	0.0	2	0.7	10	4.0	18	14.6	32	3.1
	女性	0	0.0	8	2.9	10	3.8	21	8.9	22	17.2	61	5.8
	計	2	0.7	8	1.5	12	2.2	31	6.4	40	15.9	93	4.4
ぜんぜん難しくない	男性	133	98.5	250	100.0	291	99.0	231	93.5	95	77.2	1000	95.3
	女性	148	99.3	265	96.7	254	96.2	213	89.9	87	68.0	967	91.9
	計	281	98.9	515	98.3	545	97.7	444	91.7	182	72.5	1967	93.6

SF-36：百メートル以上歩く

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.0
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6	5	4.1	9	0.9
	女性	1	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	9	7.0	11	1.0
	計	1	0.4	1	0.2	0	0.0	4	0.8	14	5.6	20	1.0
少し難しい	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	7	2.8	11	8.9	19	1.8
	女性	0	0.0	0	0.0	3	1.1	13	5.5	21	16.4	37	3.5
	計	0	0.0	0	0.0	4	0.7	20	4.1	32	12.7	56	2.7
ぜんぜん難しくない	男性	135	100.0	250	100.0	293	99.7	236	95.5	107	87.0	1021	97.3
	女性	148	99.3	273	99.6	260	98.5	224	94.5	98	76.6	1003	95.3
	計	283	99.6	523	99.8	553	99.1	460	95.0	205	81.7	2024	96.3

SF-36：自分でお風呂に入ったり、着替えたりする

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6	4	0.2
少し難しい	男性	1	0.7	1	0.4	0	0.0	2	0.8	7	5.7	11	1.0
	女性	0	0.0	2	0.7	2	0.8	5	2.1	16	12.5	25	2.4
	計	1	0.4	3	0.6	2	0.4	7	1.4	23	9.2	36	1.7
ぜんぜん難しくない	男性	134	99.3	249	99.6	294	100.0	245	99.2	114	92.7	1036	98.8
	女性	149	100.0	272	99.3	262	99.2	232	97.9	110	85.9	1025	97.4
	計	283	99.6	521	99.4	556	99.6	477	98.6	224	89.2	2061	98.1

正座をする

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	4	3.0	4	1.6	12	4.1	22	8.9	24	19.5	66	6.3
	女性	4	2.7	12	4.4	18	6.8	40	16.9	40	31.3	114	10.8
	計	8	2.8	16	3.1	30	5.4	62	12.8	64	25.5	180	8.6

少し難しい	男性	13	9.6	29	11.6	53	18.0	60	24.3	29	23.6	184	17.5
	女性	12	8.1	28	10.2	44	16.7	50	21.1	33	25.8	167	15.9
	計	25	8.8	57	10.9	97	17.4	110	22.7	62	24.7	351	16.7
ぜんぜん難しくない	男性	118	87.4	217	86.8	229	77.9	165	66.8	70	56.9	799	76.2
	女性	133	89.3	234	85.4	202	76.5	147	62.0	55	43.0	771	73.3
	計	251	88.4	451	86.1	431	77.2	312	64.5	125	49.8	1570	74.7

6) 要介護認定

要介護認定

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受けたことがない	男性	135	100.0	250	100.0	293	99.7	241	97.6	108	87.8	1027	97.9
	女性	149	100.0	274	100.0	264	100.0	229	96.6	94	73.4	1010	96.0
	計	284	100.0	524	100.0	557	99.8	470	97.1	202	80.5	2037	97.0
以前受けたが、現在は受けていない	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.8	4	3.3	7	0.7
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3	7	5.5	10	1.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	1.0	11	4.4	17	0.8
現在、受けている	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6	11	8.9	15	1.4
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.1	27	21.1	32	3.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	1.9	38	15.1	47	2.2

現在の介護度（現在認定を受けている者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
要支援 1	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	6.7
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	9	33.3	11	34.4
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	10	26.3	12	25.5
要支援 2	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	3	27.3	4	26.7
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	12	44.4	15	46.9
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	44.4	15	39.5	19	40.4
要介護 1	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	3	27.3	5	33.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	2	6.3
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	5	13.2	7	14.9
要介護 2	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	36.4	4	26.7
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	2	6.3
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	15.8	6	12.8
要介護 3	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	3.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.1
要介護 4	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	3.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.1
要介護 5	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	6.7
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	2.1

7) 膝および腰の既往歴と痛み

膝関節痛の有無

	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上	計
--	---------	---------	---------	---------	-------	---

		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	14	10.4	37	14.8	48	16.3	64	25.9	41	33.3	204	19.4
	女性	17	11.4	54	19.7	63	23.9	77	32.5	56	43.8	267	25.4
	計	31	10.9	91	17.4	111	19.9	141	29.1	97	38.6	471	22.4
なし	男性	121	89.6	213	85.2	246	83.7	183	74.1	82	66.7	845	80.6
	女性	132	88.6	220	80.3	201	76.1	160	67.5	72	56.3	785	74.6
	計	253	89.1	433	82.6	447	80.1	343	70.9	154	61.4	1630	77.6

膝関節疾患既往歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	9	6.7	19	7.6	39	13.3	34	13.8	22	17.9	123	11.7
	女性	10	6.7	35	12.8	58	22.0	77	32.5	55	43.0	235	22.3
	計	19	6.7	54	10.3	97	17.4	111	22.9	77	30.7	358	17.0
なし	男性	126	93.3	231	92.4	255	86.7	213	86.2	101	82.1	926	88.3
	女性	139	93.3	239	87.2	206	78.0	160	67.5	73	57.0	817	77.7
	計	265	93.3	470	89.7	461	82.6	373	77.1	174	69.3	1743	83.0

腰痛の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	35	25.9	73	29.2	96	32.7	82	33.2	48	39.0	334	31.8
	女性	28	18.8	79	28.8	83	31.4	75	31.6	59	46.1	324	30.8
	計	63	22.2	152	29.0	179	32.1	157	32.4	107	42.6	658	31.3
なし	男性	100	74.1	177	70.8	198	67.3	165	66.8	75	61.0	715	68.2
	女性	121	81.2	195	71.2	181	68.6	162	68.4	69	53.9	728	69.2
	計	221	77.8	372	71.0	379	67.9	327	67.6	144	57.4	1443	68.7

腰・股関節疾患既往歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
あり	男性	21	15.6	55	22.0	74	25.2	67	27.1	37	30.1	254	24.2
	女性	19	12.8	47	17.2	65	24.6	59	24.9	48	37.5	238	22.6
	計	40	14.1	102	19.5	139	24.9	126	26.0	85	33.9	492	23.4
なし	男性	114	84.4	195	78.0	220	74.8	180	72.9	86	69.9	795	75.8
	女性	130	87.2	227	82.8	199	75.4	177	74.7	80	62.5	813	77.3
	計	244	85.9	422	80.5	419	75.1	357	73.8	166	66.1	1608	76.5

4. 視覚

眼鏡・コンタクトレンズの使用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	93	68.9	207	82.8	264	89.8	211	85.4	109	88.6	884	84.3
	女性	101	67.8	230	83.9	237	89.8	212	89.5	111	86.7	891	84.7
	計	194	68.3	437	83.4	501	89.8	423	87.4	220	87.6	1775	84.5

なし	男性	42	31.1	43	17.2	30	10.2	36	14.6	14	11.4	165	15.7
	女性	48	32.2	44	16.1	27	10.2	25	10.5	17	13.3	161	15.3
	計	90	31.7	87	16.6	57	10.2	61	12.6	31	12.4	326	15.5

眼鏡・コンタクトレンズの種類（眼鏡・コンタクトレンズ使用者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
遠用	男性	50	53.8	63	30.4	41	15.5	20	9.5	8	7.3	182	20.6
	女性	63	62.4	67	29.1	30	12.7	18	8.5	4	3.6	182	20.4
	計	113	58.2	130	29.7	71	14.2	38	9.0	12	5.5	364	20.5
近用（老眼鏡）	男性	22	23.7	39	18.8	72	27.3	60	28.4	29	26.6	222	25.1
	女性	21	20.8	70	30.4	97	40.9	73	34.4	42	37.8	303	34.0
	計	43	22.2	109	24.9	169	33.7	133	31.4	71	32.3	525	29.6
遠用と近用の両方	男性	21	22.6	105	50.7	151	57.2	131	62.1	72	66.1	480	54.3
	女性	17	16.8	93	40.4	110	46.4	121	57.1	65	58.6	406	45.6
	計	38	19.6	198	45.3	261	52.1	252	59.6	137	62.3	886	49.9

視力を含めた見え具合の自己評価（眼鏡・コンタクトレンズを使用した状態で）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.6	3	0.3
	女性	1	0.7	0	0.0	1	0.4	2	0.8	0	0.0	4	0.4
	計	1	0.4	1	0.2	1	0.2	2	0.4	2	0.8	7	0.3
とても良い	男性	14	10.4	17	6.8	13	4.4	14	5.7	5	4.1	63	6.0
	女性	6	4.0	10	3.6	9	3.4	12	5.1	8	6.3	45	4.3
	計	20	7.0	27	5.2	22	3.9	26	5.4	13	5.2	108	5.1
良い	男性	24	17.8	41	16.4	75	25.5	61	24.7	20	16.3	221	21.1
	女性	38	25.5	70	25.5	65	24.6	50	21.1	26	20.3	249	23.7
	計	62	21.8	111	21.2	140	25.1	111	22.9	46	18.3	470	22.4
普通	男性	78	57.8	157	62.8	177	60.2	142	57.5	85	69.1	639	60.9
	女性	79	53.0	154	56.2	172	65.2	150	63.3	75	58.6	630	59.9
	計	157	55.3	311	59.4	349	62.5	292	60.3	160	63.7	1269	60.4
悪い	男性	19	14.1	33	13.2	26	8.8	30	12.1	10	8.1	118	11.2
	女性	23	15.4	40	14.6	14	5.3	23	9.7	18	14.1	118	11.2
	計	42	14.8	73	13.9	40	7.2	53	11.0	28	11.2	236	11.2
とても悪い	男性	0	0.0	1	0.4	3	1.0	0	0.0	1	0.8	5	0.5
	女性	2	1.3	0	0.0	3	1.1	0	0.0	1	0.8	6	0.6
	計	2	0.7	1	0.2	6	1.1	0	0.0	2	0.8	11	0.5

5. 聴覚

補聴器の使用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
よく使用している	男性	1	0.7	0	0.0	4	1.4	8	3.2	12	9.8	25	2.4
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.8	6	2.5	10	7.8	19	1.8
	計	1	0.4	1	0.2	6	1.1	14	2.9	22	8.8	44	2.1
ときどき使用している	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	9	3.6	8	6.5	18	1.7
	女性	0	0.0	0	0.0	3	1.1	2	0.8	8	6.3	13	1.2
	計	0	0.0	0	0.0	4	0.7	11	2.3	16	6.4	31	1.5
持っているが、使用	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	3	2.4	6	0.6

よく思う	男性	0	0.0	0	0.0	2	1.4	3	2.2	6	7.8	11	2.2
	女性	1	1.9	2	1.9	1	0.8	3	2.2	8	9.0	15	2.9
	計	1	1.1	2	1.0	3	1.1	6	2.2	14	8.4	26	2.6
たまに思う	男性	0	0.0	12	11.7	17	11.5	19	14.0	18	23.4	66	13.0
	女性	7	13.5	15	14.4	22	16.8	27	20.1	28	31.5	99	19.4
	計	7	7.4	27	13.0	39	14.0	46	17.0	46	27.7	165	16.2
思わない	男性	42	100.0	91	88.3	129	87.2	114	83.8	53	68.8	429	84.8
	女性	44	84.6	87	83.7	108	82.4	104	77.6	53	59.6	396	77.6
	計	86	91.5	178	86.0	237	84.9	218	80.7	106	63.9	825	81.2

音は聞こえても言葉が聞き取りにくいと感じることがある（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
よくある	男性	2	4.8	10	9.7	11	7.4	37	27.2	28	36.4	88	17.4
	女性	5	9.6	12	11.5	13	9.9	17	12.7	27	30.3	74	14.5
	計	7	7.4	22	10.6	24	8.6	54	20.0	55	33.1	162	15.9
たまにある	男性	28	66.7	66	64.1	105	70.9	71	52.2	36	46.8	306	60.5
	女性	38	73.1	74	71.2	95	72.5	104	77.6	55	61.8	366	71.8
	計	66	70.2	140	67.6	200	71.7	175	64.8	91	54.8	672	66.1
ない	男性	12	28.6	27	26.2	32	21.6	28	20.6	13	16.9	112	22.1
	女性	9	17.3	18	17.3	23	17.6	13	9.7	7	7.9	70	13.7
	計	21	22.3	45	21.7	55	19.7	41	15.2	20	12.0	182	17.9

テレビを見ているとき、ニュースの内容が聞き取れる（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ほとんどすべて聞き取れる	男性	36	85.7	84	81.6	113	76.4	88	64.7	47	61.0	368	72.7
	女性	47	90.4	94	90.4	105	80.2	108	80.6	58	65.2	412	80.8
	計	83	88.3	178	86.0	218	78.1	196	72.6	105	63.3	780	76.8
たまに聞き取れない時がある	男性	6	14.3	19	18.4	34	23.0	44	32.4	26	33.8	129	25.5
	女性	5	9.6	9	8.7	26	19.8	26	19.4	29	32.6	95	18.6
	計	11	11.7	28	13.5	60	21.5	70	25.9	55	33.1	224	22.0
聞き取れないことの方が多	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.7	4	2.9	4	5.2	9	1.8
	女性	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	3	0.6
	計	0	0.0	1	0.5	1	0.4	4	1.5	6	3.6	12	1.2

静かな部屋で4～5人で話をするとき内容が聞き取れる（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ほとんどすべて聞き取れる	男性	29	69.0	81	78.6	85	57.4	70	51.5	30	39.0	295	58.3
	女性	36	69.2	77	74.0	87	66.4	74	55.2	35	39.3	309	60.6
	計	65	69.1	158	76.3	172	61.6	144	53.3	65	39.2	604	59.4
たまに聞き取れない時がある	男性	13	31.0	22	21.4	60	40.5	59	43.4	37	48.1	191	37.7
	女性	16	30.8	26	25.0	43	32.8	58	43.3	45	50.6	188	36.9
	計	29	30.9	48	23.2	103	36.9	117	43.3	82	49.4	379	37.3
聞き取れないことの方が多	男性	0	0.0	0	0.0	3	2.0	7	5.1	10	13.0	20	4.0
	女性	0	0.0	1	1.0	1	0.8	2	1.5	9	10.1	13	2.5
	計	0	0.0	1	0.5	4	1.4	9	3.3	19	11.4	33	3.2

6. 転倒

転倒恐怖感

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とてもこわい	男性	5	3.7	3	1.2	4	1.4	10	4.0	23	18.7	45	4.3
	女性	9	6.0	25	9.1	25	9.5	47	19.8	55	43.0	161	15.3
	計	14	4.9	28	5.3	29	5.2	57	11.8	78	31.1	206	9.8
少しこわい	男性	29	21.5	54	21.6	96	32.7	90	36.4	57	46.3	326	31.1
	女性	54	36.2	125	45.6	147	55.7	141	59.5	52	40.6	519	49.3
	計	83	29.2	179	34.2	243	43.5	231	47.7	109	43.4	845	40.2
こわくない	男性	101	74.8	193	77.2	194	66.0	147	59.5	43	35.0	678	64.6
	女性	86	57.7	124	45.3	92	34.8	49	20.7	21	16.4	372	35.4
	計	187	65.8	317	60.5	286	51.3	196	40.5	64	25.5	1050	50.0

過去1年間の転倒経験

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	19	14.1	21	8.4	38	12.9	48	19.4	39	31.7	165	15.7
	女性	19	12.8	52	19.0	51	19.3	53	22.4	44	34.4	219	20.8
	計	38	13.4	73	13.9	89	15.9	101	20.9	83	33.1	384	18.3
なし	男性	116	85.9	229	91.6	256	87.1	199	80.6	84	68.3	884	84.3
	女性	130	87.2	222	81.0	213	80.7	184	77.6	84	65.6	833	79.2
	計	246	86.6	451	86.1	469	84.1	383	79.1	168	66.9	1717	81.7

過去1年間の転倒回数（転倒経験者のみ）

		40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
		平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性		2.6	3.6	19	7.9	21.8	21	1.9	1.0	37	1.7	0.8	47	2.0	1.2	39	2.7	8.0	163
女性		2.3	4.3	19	1.6	1.0	51	1.5	0.9	51	1.4	0.6	53	2.2	1.7	44	1.7	1.7	218
計		2.4	3.9	38	3.4	11.9	72	1.7	1.0	88	1.6	0.7	100	2.1	1.5	83	2.2	5.4	381

7. 排尿

1) 排尿症状

排尿後にまだ残っている感じがある（最近1ヵ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	0.2
	計	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.1
まったくなし	男性	111	82.2	189	75.6	158	53.7	141	57.1	72	58.5	671	64.0
	女性	136	91.3	236	86.1	221	83.7	179	75.5	93	72.7	865	82.2
	計	247	87.0	425	81.1	379	67.9	320	66.1	165	65.7	1536	73.1
5回に1回の割合未満	男性	16	11.9	47	18.8	93	31.6	77	31.2	27	22.0	260	24.8
	女性	9	6.0	35	12.8	33	12.5	46	19.4	22	17.2	145	13.8
	計	25	8.8	82	15.6	126	22.6	123	25.4	49	19.5	405	19.3
2回に1回の割合未満	男性	2	1.5	5	2.0	25	8.5	11	4.5	4	3.3	47	4.5
	女性	1	0.7	1	0.4	9	3.4	2	0.8	4	3.1	17	1.6
	計	3	1.1	6	1.1	34	6.1	13	2.7	8	3.2	64	3.0
2回に1回の割合	男性	3	2.2	1	0.4	7	2.4	4	1.6	8	6.5	23	2.2

	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.7	2	1.6	6	0.6
	計	3	1.1	1	0.2	7	1.3	8	1.7	10	4.0	29	1.4
2回に1回の割合以上	男性	1	0.7	4	1.6	5	1.7	6	2.4	4	3.3	20	1.9
	女性	1	0.7	1	0.4	1	0.4	4	1.7	1	0.8	8	0.8
	計	2	0.7	5	1.0	6	1.1	10	2.1	5	2.0	28	1.3
ほとんど常に	男性	2	1.5	4	1.6	6	2.0	8	3.2	8	6.5	28	2.7
	女性	1	0.7	1	0.4	0	0.0	2	0.8	5	3.9	9	0.9
	計	3	1.1	5	1.0	6	1.1	10	2.1	13	5.2	37	1.8

排尿後2時間以内にもう一度行かねばならないことがある（最近1ヵ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	0.2
	計	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.1
まったくなし	男性	72	53.3	117	46.8	88	29.9	84	34.0	33	26.8	394	37.6
	女性	83	55.7	131	47.8	105	39.8	102	43.0	48	37.5	469	44.6
	計	155	54.6	248	47.3	193	34.6	186	38.4	81	32.3	863	41.1
5回に1回の割合未満	男性	45	33.3	95	38.0	138	46.9	101	40.9	42	34.1	421	40.1
	女性	53	35.6	115	42.0	118	44.7	94	39.7	43	33.6	423	40.2
	計	98	34.5	210	40.1	256	45.9	195	40.3	85	33.9	844	40.2
2回に1回の割合未満	男性	10	7.4	16	6.4	31	10.5	27	10.9	13	10.6	97	9.2
	女性	5	3.4	17	6.2	21	8.0	23	9.7	14	10.9	80	7.6
	計	15	5.3	33	6.3	52	9.3	50	10.3	27	10.8	177	8.4
2回に1回の割合	男性	2	1.5	7	2.8	16	5.4	9	3.6	15	12.2	49	4.7
	女性	1	0.7	5	1.8	9	3.4	8	3.4	15	11.7	38	3.6
	計	3	1.1	12	2.3	25	4.5	17	3.5	30	12.0	87	4.1
2回に1回の割合以上	男性	4	3.0	6	2.4	11	3.7	4	1.6	8	6.5	33	3.1
	女性	3	2.0	3	1.1	2	0.8	4	1.7	2	1.6	14	1.3
	計	7	2.5	9	1.7	13	2.3	8	1.7	10	4.0	47	2.2
ほとんど常に	男性	2	1.5	9	3.6	10	3.4	22	8.9	12	9.8	55	5.2
	女性	3	2.0	3	1.1	9	3.4	6	2.5	5	3.9	26	2.5
	計	5	1.8	12	2.3	19	3.4	28	5.8	17	6.8	81	3.9

排尿途中で尿が切れることがある（最近1ヵ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	0.2
	計	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.1
まったくなし	男性	122	90.4	208	83.2	188	63.9	145	58.7	53	43.1	716	68.3
	女性	137	91.9	257	93.8	224	84.8	175	73.8	93	72.7	886	84.2
	計	259	91.2	465	88.7	412	73.8	320	66.1	146	58.2	1602	76.2
5回に1回の割合未満	男性	6	4.4	33	13.2	58	19.7	59	23.9	38	30.9	194	18.5
	女性	10	6.7	15	5.5	33	12.5	44	18.6	22	17.2	124	11.8
	計	16	5.6	48	9.2	91	16.3	103	21.3	60	23.9	318	15.1
2回に1回の割合未満	男性	1	0.7	4	1.6	17	5.8	18	7.3	6	4.9	46	4.4
	女性	0	0.0	1	0.4	4	1.5	6	2.5	5	3.9	16	1.5
	計	1	0.4	5	1.0	21	3.8	24	5.0	11	4.4	62	3.0
2回に1回の割合	男性	2	1.5	1	0.4	8	2.7	6	2.4	9	7.3	26	2.5
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.1	0	0.0	5	0.5

	計	2	0.7	1	0.2	8	1.4	11	2.3	9	3.6	31	1.5
2回に1回の割合以上	男性	0	0.0	2	0.8	11	3.7	3	1.2	6	4.9	22	2.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.5	3	2.3	9	0.9
	計	0	0.0	2	0.4	11	2.0	9	1.9	9	3.6	31	1.5
ほとんど常に	男性	4	3.0	2	0.8	12	4.1	16	6.5	11	8.9	45	4.3
	女性	1	0.7	1	0.4	3	1.1	1	0.4	4	3.1	10	1.0
	計	5	1.8	3	0.6	15	2.7	17	3.5	15	6.0	55	2.6

排尿をがまんするのがつらいことがある（最近1ヵ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	0.2
	計	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.1
まったくなし	男性	121	89.6	197	78.8	151	51.4	110	44.5	53	43.1	632	60.2
	女性	112	75.2	213	77.7	174	65.9	126	53.2	58	45.3	683	64.9
	計	233	82.0	410	78.2	325	58.2	236	48.8	111	44.2	1315	62.6
5回に1回の割合未満	男性	10	7.4	43	17.2	108	36.7	92	37.2	37	30.1	290	27.6
	女性	31	20.8	52	19.0	76	28.8	78	32.9	44	34.4	281	26.7
	計	41	14.4	95	18.1	184	33.0	170	35.1	81	32.3	571	27.2
2回に1回の割合未満	男性	2	1.5	5	2.0	16	5.4	14	5.7	7	5.7	44	4.2
	女性	3	2.0	4	1.5	9	3.4	14	5.9	3	2.3	33	3.1
	計	5	1.8	9	1.7	25	4.5	28	5.8	10	4.0	77	3.7
2回に1回の割合	男性	0	0.0	1	0.4	1	0.3	7	2.8	7	5.7	16	1.5
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	1.3	7	5.5	11	1.0
	計	0	0.0	2	0.4	1	0.2	10	2.1	14	5.6	27	1.3
2回に1回の割合以上	男性	0	0.0	1	0.4	7	2.4	9	3.6	6	4.9	23	2.2
	女性	0	0.0	2	0.7	1	0.4	4	1.7	5	3.9	12	1.1
	計	0	0.0	3	0.6	8	1.4	13	2.7	11	4.4	35	1.7
ほとんど常に	男性	2	1.5	3	1.2	11	3.7	15	6.1	13	10.6	44	4.2
	女性	2	1.3	2	0.7	4	1.5	12	5.1	10	7.8	30	2.9
	計	4	1.4	5	1.0	15	2.7	27	5.6	23	9.2	74	3.5

尿の勢いが弱いことがある（最近1ヵ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	0.2
	計	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.4	3	0.1
まったくなし	男性	102	75.6	156	62.4	113	38.4	73	29.6	29	23.6	473	45.1
	女性	126	84.6	225	82.1	170	64.4	129	54.4	64	50.0	714	67.9
	計	228	80.3	381	72.7	283	50.7	202	41.7	93	37.1	1187	56.5
5回に1回の割合未満	男性	26	19.3	66	26.4	112	38.1	90	36.4	39	31.7	333	31.7
	女性	19	12.8	43	15.7	72	27.3	62	26.2	29	22.7	225	21.4
	計	45	15.8	109	20.8	184	33.0	152	31.4	68	27.1	558	26.6
2回に1回の割合未満	男性	0	0.0	13	5.2	20	6.8	22	8.9	10	8.1	65	6.2
	女性	2	1.3	3	1.1	10	3.8	12	5.1	8	6.3	35	3.3
	計	2	0.7	16	3.1	30	5.4	34	7.0	18	7.2	100	4.8
2回に1回の割合	男性	3	2.2	2	0.8	9	3.1	6	2.4	9	7.3	29	2.8
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	9	3.8	2	1.6	12	1.1
	計	3	1.1	2	0.4	10	1.8	15	3.1	11	4.4	41	2.0

2回に1回の割合以上	男性	1	0.7	3	1.2	11	3.7	9	3.6	9	7.3	33	3.1
	女性	1	0.7	1	0.4	2	0.8	7	3.0	2	1.6	13	1.2
	計	2	0.7	4	0.8	13	2.3	16	3.3	11	4.4	46	2.2
ほとんど常に	男性	3	2.2	10	4.0	29	9.9	46	18.6	27	22.0	115	11.0
	女性	0	0.0	2	0.7	9	3.4	18	7.6	22	17.2	51	4.8
	計	3	1.1	12	2.3	38	6.8	64	13.2	49	19.5	166	7.9

排尿開始時にいきむ必要がある（最近1ヵ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	1	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	0.3
	計	1	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.4	4	0.2
まったくなし	男性	120	88.9	220	88.0	214	72.8	170	68.8	77	62.6	801	76.4
	女性	136	91.3	257	93.8	234	88.6	194	81.9	104	81.3	925	87.9
	計	256	90.1	477	91.0	448	80.3	364	75.2	181	72.1	1726	82.2
5回に1回の割合未満	男性	12	8.9	23	9.2	55	18.7	49	19.8	27	22.0	166	15.8
	女性	10	6.7	11	4.0	25	9.5	30	12.7	13	10.2	89	8.5
	計	22	7.7	34	6.5	80	14.3	79	16.3	40	15.9	255	12.1
2回に1回の割合未満	男性	1	0.7	1	0.4	8	2.7	11	4.5	5	4.1	26	2.5
	女性	2	1.3	1	0.4	2	0.8	5	2.1	1	0.8	11	1.0
	計	3	1.1	2	0.4	10	1.8	16	3.3	6	2.4	37	1.8
2回に1回の割合	男性	0	0.0	3	1.2	7	2.4	4	1.6	4	3.3	18	1.7
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.6	3	0.3
	計	0	0.0	4	0.8	7	1.3	4	0.8	6	2.4	21	1.0
2回に1回の割合以上	男性	0	0.0	1	0.4	8	2.7	5	2.0	6	4.9	20	1.9
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	6	2.5	3	2.3	10	1.0
	計	0	0.0	1	0.2	9	1.6	11	2.3	9	3.6	30	1.4
ほとんど常に	男性	2	1.5	2	0.8	2	0.7	7	2.8	4	3.3	17	1.6
	女性	0	0.0	3	1.1	2	0.8	2	0.8	4	3.1	11	1.0
	計	2	0.7	5	1.0	4	0.7	9	1.9	8	3.2	28	1.3

床についてから朝起きるまでの排尿回数（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	0.2
	計	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.1
まったくなし	男性	83	61.5	131	52.4	70	23.8	23	9.3	9	7.3	316	30.1
	女性	105	70.5	169	61.7	86	32.6	41	17.3	19	14.8	420	39.9
	計	188	66.2	300	57.3	156	28.0	64	13.2	28	11.2	736	35.0
1回	男性	49	36.3	93	37.2	154	52.4	110	44.5	39	31.7	445	42.4
	女性	38	25.5	87	31.8	135	51.1	116	48.9	46	35.9	422	40.1
	計	87	30.6	180	34.4	289	51.8	226	46.7	85	33.9	867	41.3
2回	男性	1	0.7	22	8.8	54	18.4	71	28.7	41	33.3	189	18.0
	女性	3	2.0	15	5.5	39	14.8	61	25.7	35	27.3	153	14.5
	計	4	1.4	37	7.1	93	16.7	132	27.3	76	30.3	342	16.3
3回	男性	2	1.5	4	1.6	12	4.1	33	13.4	25	20.3	76	7.2
	女性	1	0.7	2	0.7	3	1.1	15	6.3	21	16.4	42	4.0
	計	3	1.1	6	1.1	15	2.7	48	9.9	46	18.3	118	5.6
4回	男性	0	0.0	0	0.0	3	1.0	7	2.8	9	7.3	19	1.8

	女性	1	0.7	0	0.0	1	0.4	2	0.8	6	4.7	10	1.0
	計	1	0.4	0	0.0	4	0.7	9	1.9	15	6.0	29	1.4
5回以上	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.2	0	0.0	4	0.4
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	3	0.3
	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	5	1.0	0	0.0	7	0.3

国際前立腺症状スコア (IPSS: Cockett et al. (1993)に基づき算出)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	2.5	4.0	135	3.2	4.1	250	6.2	5.5	294	7.6	6.4	246	9.9	7.9	123	5.8	6.1	1048
女性	1.8	2.8	148	2.1	2.8	273	3.4	3.5	264	5.0	4.9	237	6.6	6.1	127	3.6	4.3	1049
計	2.1	3.4	283	2.6	3.5	523	4.8	4.9	558	6.4	5.9	483	8.3	7.2	250	4.7	5.4	2097

国際前立腺症状スコア (IPSS) 分類

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	1	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	0.3
	計	1	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.4	4	0.2
軽度 (0-7)	男性	125	92.6	219	87.6	204	69.4	154	62.3	60	48.8	762	72.6
	女性	140	94.0	260	94.9	239	90.5	181	76.4	87	68.0	907	86.2
	計	265	93.3	479	91.4	443	79.4	335	69.2	147	58.6	1669	79.4
中等度 (8-19)	男性	8	5.9	28	11.2	80	27.2	79	32.0	47	38.2	242	23.1
	女性	8	5.4	12	4.4	25	9.5	53	22.4	34	26.6	132	12.5
	計	16	5.6	40	7.6	105	18.8	132	27.3	81	32.3	374	17.8
重度 (20-35)	男性	2	1.5	3	1.2	10	3.4	13	5.3	16	13.0	44	4.2
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	1.3	6	4.7	10	1.0
	計	2	0.7	4	0.8	10	1.8	16	3.3	22	8.8	54	2.6

排尿状態の自己評価

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
大変満足	男性	22	16.3	31	12.4	19	6.5	14	5.7	2	1.6	88	8.4
	女性	29	19.5	49	17.9	26	9.8	14	5.9	4	3.1	122	11.6
	計	51	18.0	80	15.3	45	8.1	28	5.8	6	2.4	210	10.0
満足	男性	52	38.5	65	26.0	60	20.4	41	16.6	22	17.9	240	22.9
	女性	56	37.6	76	27.7	70	26.5	59	24.9	23	18.0	284	27.0
	計	108	38.0	141	26.9	130	23.3	100	20.7	45	17.9	524	24.9
だいたい満足	男性	20	14.8	66	26.4	69	23.5	70	28.3	31	25.2	256	24.4
	女性	29	19.5	78	28.5	67	25.4	69	29.1	49	38.3	292	27.8
	計	49	17.3	144	27.5	136	24.4	139	28.7	80	31.9	548	26.1
満足・不満足どちらでもない	男性	25	18.5	57	22.8	61	20.7	59	23.9	24	19.5	226	21.5
	女性	21	14.1	50	18.2	69	26.1	52	21.9	28	21.9	220	20.9
	計	46	16.2	107	20.4	130	23.3	111	22.9	52	20.7	446	21.2
不満気味	男性	12	8.9	21	8.4	60	20.4	40	16.2	29	23.6	162	15.4
	女性	8	5.4	14	5.1	22	8.3	26	11.0	11	8.6	81	7.7

	計	20	7.0	35	6.7	82	14.7	66	13.6	40	15.9	243	11.6
不満	男性	4	3.0	6	2.4	18	6.1	13	5.3	11	8.9	52	5.0
	女性	2	1.3	4	1.5	9	3.4	11	4.6	10	7.8	36	3.4
	計	6	2.1	10	1.9	27	4.8	24	5.0	21	8.4	88	4.2
大変不満	男性	0	0.0	4	1.6	7	2.4	10	4.0	4	3.3	25	2.4
	女性	3	2.0	3	1.1	1	0.4	6	2.5	3	2.3	16	1.5
	計	3	1.1	7	1.3	8	1.4	16	3.3	7	2.8	41	2.0

2) 尿失禁

尿漏れ経験

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
あり	男性	5	3.7	13	5.2	57	19.4	52	21.1	35	28.5	162	15.4
	女性	69	46.3	153	55.8	130	49.2	129	54.4	72	56.3	553	52.6
	計	74	26.1	166	31.7	187	33.5	181	37.4	107	42.6	715	34.0
なし	男性	130	96.3	237	94.8	237	80.6	195	78.9	88	71.5	887	84.6
	女性	79	53.0	121	44.2	134	50.8	108	45.6	56	43.8	498	47.3
	計	209	73.6	358	68.3	371	66.5	303	62.6	144	57.4	1385	65.9

現在の尿漏れ（尿漏れ経験のある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	1	20.0	7	53.8	48	84.2	42	80.8	27	77.1	125	77.2
	女性	41	59.4	98	64.1	88	67.7	93	72.1	60	83.3	380	68.7
	計	42	56.8	105	63.3	136	72.7	135	74.6	87	81.3	505	70.6
なし	男性	4	80.0	6	46.2	9	15.8	10	19.2	8	22.9	37	22.8
	女性	28	40.6	55	35.9	42	32.3	36	27.9	12	16.7	173	31.3
	計	32	43.2	61	36.7	51	27.3	46	25.4	20	18.7	210	29.4

尿漏れの頻度（現在、尿漏れのある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.3
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.2
およそ1週間に1回、 あるいはそれ以下	男性	0	0.0	4	57.1	32	66.7	24	57.1	14	51.9	74	59.2
	女性	36	87.8	79	80.6	69	78.4	59	63.4	27	45.0	270	71.1
	計	36	85.7	83	79.0	101	74.3	83	61.5	41	47.1	344	68.1
1週間に2～3回	男性	1	100.0	1	14.3	14	29.2	13	31.0	5	18.5	34	27.2
	女性	2	4.9	6	6.1	11	12.5	13	14.0	13	21.7	45	11.8
	計	3	7.1	7	6.7	25	18.4	26	19.3	18	20.7	79	15.6
およそ1日に1回	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	2	7.4	4	3.2
	女性	2	4.9	7	7.1	3	3.4	9	9.7	11	18.3	32	8.4
	計	2	4.8	7	6.7	3	2.2	11	8.1	13	14.9	36	7.1
1日に数回	男性	0	0.0	2	28.6	2	4.2	1	2.4	4	14.8	9	7.2
	女性	1	2.4	6	6.1	4	4.5	10	10.8	8	13.3	29	7.6
	計	1	2.4	8	7.6	6	4.4	11	8.1	12	13.8	38	7.5

常に	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	2	7.4	4	3.2
	女性	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1	1	1.7	3	0.8
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	2.2	3	3.4	7	1.4

尿漏れの量（現在、尿漏れのある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
少量	男性	1	100.0	7	100.0	43	89.6	39	92.9	24	88.9	114	91.2
	女性	40	97.6	95	96.9	86	97.7	89	95.7	57	95.0	367	96.6
	計	41	97.6	102	97.1	129	94.9	128	94.8	81	93.1	481	95.2
中等量	男性	0	0.0	0	0.0	4	8.3	3	7.1	2	7.4	9	7.2
	女性	1	2.4	2	2.0	2	2.3	3	3.2	3	5.0	11	2.9
	計	1	2.4	2	1.9	6	4.4	6	4.4	5	5.7	20	4.0
多量	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	3.7	2	1.6
	女性	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	0.5
	計	0	0.0	1	1.0	1	0.7	1	0.7	1	1.1	4	0.8

尿漏れのために毎日の生活が損なわれている度合い（現在、尿漏れのある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
0：まったくない	男性	0	0.0	3	42.9	17	35.4	10	23.8	4	14.8	34	27.2
	女性	15	36.6	30	30.6	32	36.4	19	20.4	14	23.3	110	28.9
	計	15	35.7	33	31.4	49	36.0	29	21.5	18	20.7	144	28.5
1	男性	1	100.0	2	28.6	18	37.5	15	35.7	9	33.3	45	36.0
	女性	18	43.9	36	36.7	31	35.2	34	36.6	17	28.3	136	35.8
	計	19	45.2	38	36.2	49	36.0	49	36.3	26	29.9	181	35.8
2	男性	0	0.0	2	28.6	5	10.4	6	14.3	1	3.7	14	11.2
	女性	6	14.6	15	15.3	12	13.6	18	19.4	7	11.7	58	15.3
	計	6	14.3	17	16.2	17	12.5	24	17.8	8	9.2	72	14.3
3	男性	0	0.0	0	0.0	6	12.5	4	9.5	3	11.1	13	10.4
	女性	1	2.4	8	8.2	7	8.0	11	11.8	9	15.0	36	9.5
	計	1	2.4	8	7.6	13	9.6	15	11.1	12	13.8	49	9.7
4	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	2	7.4	4	3.2
	女性	0	0.0	1	1.0	0	0.0	4	4.3	3	5.0	8	2.1
	計	0	0.0	1	1.0	0	0.0	6	4.4	5	5.7	12	2.4
5	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.1	3	11.1	6	4.8
	女性	0	0.0	2	2.0	1	1.1	5	5.4	5	8.3	13	3.4
	計	0	0.0	2	1.9	1	0.7	8	5.9	8	9.2	19	3.8
6	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	3.7	2	1.6
	女性	0	0.0	2	2.0	3	3.4	0	0.0	1	1.7	6	1.6
	計	0	0.0	2	1.9	3	2.2	1	0.7	2	2.3	8	1.6
7	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	2.4	1	3.7	3	2.4
	女性	0	0.0	1	1.0	1	1.1	1	1.1	2	3.3	5	1.3
	計	0	0.0	1	1.0	2	1.5	2	1.5	3	3.4	8	1.6
8	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	0.8
	女性	1	2.4	2	2.0	1	1.1	0	0.0	1	1.7	5	1.3
	計	1	2.4	2	1.9	1	0.7	0	0.0	2	2.3	6	1.2
9	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	0.8
	女性	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	0.5
	計	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.7	1	1.1	3	0.6
10：非常に	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	3.7	2	1.6

女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	0.3
計	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	2.3	3	0.6

尿漏れの機会（現在、尿漏れのある者のみ：複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
トイレにたどり着く前にもれる	男性	0	0.0	3	42.9	29	60.4	30	71.4	16	59.3	78	62.4
	女性	8	19.5	22	22.4	21	23.9	40	43.0	31	51.7	122	32.1
	計	8	19.0	25	23.8	50	36.8	70	51.9	47	54.0	200	39.6
せきやくしゃみをした時にもれる	男性	0	0.0	0	0.0	5	10.4	3	7.1	3	11.1	11	8.8
	女性	32	78.0	90	91.8	75	85.2	65	69.9	32	53.3	294	77.4
	計	32	76.2	90	85.7	80	58.8	68	50.4	35	40.2	305	60.4
眠っている間にもれる	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	2.4	2	7.4	4	3.2
	女性	1	2.4	0	0.0	1	1.1	3	3.2	4	6.7	9	2.4
	計	1	2.4	0	0.0	2	1.5	4	3.0	6	6.9	13	2.6
身体を動かしている時や運動している時にもれる	男性	0	0.0	1	14.3	4	8.3	5	11.9	4	14.8	14	11.2
	女性	9	22.0	24	24.5	12	13.6	10	10.8	10	16.7	65	17.1
	計	9	21.4	25	23.8	16	11.8	15	11.1	14	16.1	79	15.6
排尿を終えて服を着た時にもれる	男性	1	100.0	5	71.4	17	35.4	6	14.3	3	11.1	32	25.6
	女性	0	0.0	6	6.1	3	3.4	1	1.1	2	3.3	12	3.2
	計	1	2.4	11	10.5	20	14.7	7	5.2	5	5.7	44	8.7
理由がわからずにもれる	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	2.4	5	18.5	7	5.6
	女性	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	2.2	3	5.0	6	1.6
	計	0	0.0	0	0.0	2	1.5	3	2.2	8	9.2	13	2.6
常にもれている	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	0.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	0.3
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	2	0.4
その他	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.1	3	7.1	2	7.4	6	4.8
	女性	3	7.3	4	4.1	4	4.5	4	4.3	4	6.7	19	5.0
	計	3	7.1	4	3.8	5	3.7	7	5.2	6	6.9	25	5.0
計	男性	1	100.0	7	100.0	48	100.0	42	100.0	27	100.0	125	100.0
	女性	41	100.0	98	100.0	88	100.0	93	100.0	60	100.0	380	100.0
	計	42	100.0	105	100.0	136	100.0	135	100.0	87	100.0	505	100.0